

schmäleren, an den Seiten kräftiger ausgeschweiften Halschild sowie durch die mehr eingeschnürten Hemielytren zu unterscheiden.

Java: Banjuwangi, 1909, MAC GILLAVRY, 1 ♂, (Museum Helsingfors).

Div. **HALTICARIA** REUTER.

71. **Halticus tibialis** REUTER.

REUTER, Rev. d'Ent., 1891, p. 135.

Java: Tengger Gebirge.

PHYLINAE REUTER.

Div. **PHYLARIA** REUTER.

72. **Atractotomus coxalis** REUTER.

REUTER, Rev. d'Ent., 1891, p. 136.

Java: Tengger Gebirge (Museum Helsingfors).

73. **Campylomma livida** REUTER.

REUTER, Ent. Tidskr. Stockh. 1884, p. 199. — DISTANT, Faun. Brit. Ind., Rhynch. II, p. 483, fig. 316.

Java: Tandjong-Priok, VI. 1908, E. JACOBSON. — Bengalen; Formosa; Victoria.

74. **Campylomma monticola** n. sp.

Ziemlich glänzend, anliegend hell behaart; gelb; die Augen und die Fühler schwarz; die Basis und die äusserste Spitze des ersten Gliedes gelb; die Vorderschenkel mit einigen kleinen Flecken unten, die hinteren mit mehreren grösseren Flecken unten, die Mittelschenkel ausserdem oben an der Spitze mit einem kleinen, die Hinterschenkel vor der Spitze mit drei grösseren schwarzen Flecken; die Spitze des letzten Fussgliedes braun.

Der Kopf ist vertical, breit. Die Stirn beim ♂ etwa $\frac{1}{3}$