

Extrêmement voisine de la *M. ragusana* Fieb. (*ajugarum* Frey), elle s'en distingue par ses cils bien plus courts, plus rares, plus droits et plus régulièrement espacés sur les bords. Le rebord du pronotum est plus égal, l'angle huméral plus arrondi, tandis que dans la *M. ragusana* le rebord est plus étroit en avant et l'angle huméral est bien plus saillant et plus aigu.

Parmi les autres *Monanthia* hispides, la *M. reticulata* H. S. s'en éloigne par ses rebords larges et à trois séries de cellules; les *M. pilosa* Fieb. et *villosa* Costa (*Kiesenwetteri* Muls. et Rey) par le rebord du pronotum étroit, réfléchi, non explané. La *M. crispata* H. S. me paraît la même espèce que la *villosa* Costa.

Cette jolie espèce a été trouvée à Avignon par le Frère Thélesphore, qui a bien voulu m'en envoyer plusieurs exemplaires.

6. ORTHOCEPHALUS CORACINUS Fieb. (inédit).

(Pl. 7, fig. 6 et 7.)

Entièrement d'un noir brillant à reflets bleuâtres, hérissé de soies noires courtes et raides. Pattes et antennes à soies noires; deuxième article des antennes notablement plus longs que les deux suivants réunis. Pronotum très-finement ruguleux; écusson un peu plus fortement et les rides plus régulièrement transversales.

♂. Étroit parallèle, membrane développée, d'un noir foncé, avec un trait blanchâtre à l'extrémité du cunéus.

♀. Élargie en arrière, la plus grande largeur un peu après le milieu des cories, qui sont sans membrane.

Longueur ♂ et ♀ : 5 millimètres.

Cette espèce est voisine de l'*O. saltator* Hahn, mais plus petite de deux millimètres, d'un noir plus brillant et plus bleuâtre; les soies plus raides et moins couchées, sans pubescence argentée, la membrane plus foncée, les tibias noirs.

Je l'ai trouvée à Saint-Tropez et on me l'a communiquée de Béziers (Marquet), de Palerme (Ragusa); le dessin de Fieber porte les indications Dalmatie, Corfou et Rhodes.