

large que les autres espèces du genre, a un peu l'aspect du *Pachyxyphus lineellus*, dont elle diffère d'ailleurs sous bien des points.

Je l'ai trouvée à la Sainte-Baume (Var).

11. MACROCOLEUS PAYKULII Fall.

Var. *nigripes* Put.

Dessous du corps, pattes, antennes et souvent épistome noirs. Pubescence des élytres plus rare et très-rarement disposée par taches.

Le type a le dessous du corps, les pattes et les antennes d'un jaune verdâtre pâle, avec le milieu du premier article des antennes, la base du deuxième et la base des tibias noirs.

La variété que je décris paraît faire le passage avec le *M. bicolor* Fieb.; mais cette dernière espèce est plus large; elle a la tête, le pronotum, l'écusson et le cunéus noirs, et, en outre, la pubescence noire des élytres est plus fine et très-régulière, jamais disposées par taches.

Elle vit, comme le type, sur les *Ononis*, et je l'ai rencontrée en différents endroits, notamment à Grenoble, à Montauban, à Brixen (Tyrol).

C'est probablement cette variété remarquable qui est indiquée comme *M. bicolor* dans le Catalogue des Hémiptères du Tyrol du Révérend Père Gredler.

12. MACROCOLEUS GRACILIS Put.

D'un jaune verdâtre pâle. Brillant et entièrement glabre en dessus. Une petite tache brune près de l'extrémité du premier article des antennes, et base du deuxième article étroitement brune; extrémité des tarsi noire. Membrane noirâtre; deux taches irrégulières blanches au bord externe: l'une près de la petite cellule, l'autre plus rapprochée de l'extrémité; ces deux taches sont séparées par une bande d'un noir plus foncé que le reste de la membrane; nervures des cellules blanches.

Taille du *M. Paykuli*, mais beaucoup plus étroite.