

9. ORTHOCEPHALUS SATYRISCUS Scott.

M. J. Scott a décrit, sous le nom de *Lopus satyriscus*, Berl., Ent. Zeit., 1870, p. 101, un Capside d'Espagne qui est un véritable *Orthocephalus* mâle.

J'ai reconnu, par l'inspection du type, qu'il est extrêmement voisin de l'*O. flavomarginatus* Costa, mais en diffère cependant par des caractères spécifiques réels : les yeux sont plus fortement pédonculés, et la tête avec les yeux est aussi large que le pronotum à son bord postérieur, tandis qu'elle est moins large dans l'espèce de M. Costa ; la surface des élytres est glabre, tandis qu'elle est pubescente dans le *flavomarginatus*.

10. ORTHOCEPHALUS PARALLELUS Meyer.

Fieber a confondu les *O. minor* Costa et *parallelus* Meyer.

Ce dernier ne diffère du *minor* que par ses *genoux roux* et ses *élytres à pubescence plus dense et plus longue* ; cependant je suis porté à croire que ces deux espèces sont distinctes, parce que ces différences sont constantes et que l'habitat est différent.

Le *minor* paraît propre aux pays méridionaux, le midi de la France, l'Italie, l'Algérie, la Palestine. Le *parallelus*, au contraire, ne se trouve que dans les pays montagneux ou septentrionaux, la Suisse, les Vosges, les Pyrénées.

11. MACROTYLUS MELANOCERUS (Fieb.) Put.

Rubro-testaceus, supra brevissime et tenuiter nigro-pubescentis ; antennis crassis, nigris ; pronoto antice longitudinaliter carinato, medio vage infuscato, scutello et clavo apice paulo infuscatis ; membrana nigricante, nervis flavis ; tibiis flavis, apice tarsisque obscuris.

Long., ♂, 4 mill. ; ♀, 5 mill.

Allongé, d'un rouge brique, dessus du corps avec une pubescence noire, fine et extrêmement courte. Tête rouge, convexe, extrémité du