

brunneum nigro-marginatum; occiput nigrum; antennæ palpique obscure brunnea; prothorax flavo-brunneus, medio macula nigra magna nitida trapezoidali fere sic: Δ ornata; scutellum flavo-brunneum, anguste nigro-marginatum; elytra clare brunnea, postice flavo-brunnea, sutura anguste nigro-marginata; sternum medio nigrum, lateribus flavo-et nigro-varium; abdomen nigrum, lateribus maculis 10-flavo-brunneis ornatum; pygidium flavo-brunneum, lateribus maculis 2 vagis nigris ornatum; femora supra flavo-brunnea; subtus brunneus; tibiæ brunneæ; tarsi nigri.

♂. Corpus modice robustum et amplum. Caput antice modice bilobatum, tenuiter et confertim punctatum. Prothorax trapezoidalis, antice angustior, medio rotundatus, deinde attenuatus, angulis posticis vix productis obtusis, punctis minutissimis valde sparsis instructus, postice trilunatus. Scutellum triangulare, fere læve. Elytra subdepressa, ad humeros latiora, seriebus longitudinalibus sat obsoletis punctorum instructa, apice biacuta. Mesosterni appendix sat brevis, dilatata, semicircularis. Sternum medio sparsim punctatum, lateribus flavo-pilosum, lateribus anticis tenuiter, lateribusque posticis grosse granulosum. Abdomen grosse punctatum. Pygidium fere læve. Pedes robusti, punctis grossis impressi; tibiæ anticæ extus inermes; tarsi elongati; unguiculi divaricati.

Obs. Au premier coup d'œil l'on serait tenté de classer cette espèce auprès de la *Dilochrosis Brownii* Kirby, dont elle imite à merveille la forme et surtout la livrée. Mais la brièveté de la saillie mésosternale l'exclut de la coupe sus-indiquée. Nous la croyons intermédiaire entre la *Diaphonia obliquata* Westwood (que l'on a confondu à tort avec la *Clithria eucnemis* Burmeister) et la *D. Deyrollei* Thomson (Bull. Soc. ent. Fr., 1878, p. XI, *Eupacila*). C'est là, dès lors, une espèce tout à fait remarquable qu'il est difficile de confondre avec ses congénères.

— M. le docteur A. Puton adresse les remarques qui suivent relatives à divers Hémiptères :

1° Notes de synonymie :

Orsillus maculatus Fieb. = *longirostris* Mulsant et Rey.

Ischnodemus Genei Spin. = *Championi* Saund., 1876.

Geocoris collaris Put. = *thoracicus* Put. (nomen præoccupatum : *thoracicus* Fieb.).

Monanthia Horvathi Put. = *flavipes* Horv. (nomen præoccupatum : *flavipes* Sign.).

Aradus flavicornis Dalm., 1823, = *flavomaculatus* Luc.

Halocapsus Put. = genus *Allocotus* Fieb. et Put. (nomen præoccupatum : *Allocotus* Mayr).

2° Notes de géographie entomologique :

Drymus pumilio Put. — Hautes-Pyrénées (M. Pandellé).

Holocrocanum satorejæ Kol. — Avignon (Frère Thélesphore).

Mezira tremulæ Bütt. — Hongrie (D^r Brancsik).

Metopoplax fuscinervis Stål. — Sardaigne (M. Damry).

Monanthia Olivieri Put. — Sardaigne (M. Damry).

Brachycoleus sexvittatus Reut. — Sardaigne (M. Damry).

Stenoparia Putoni Fieb. — Sardaigne (M. Damry).

— M. V. Signoret dit que, s'occupant depuis quelque temps de l'étude des Homoptères, et ayant l'intention de rédiger une Monographie des *Acocephalides* d'Europe, en suivant l'ordre indiqué dans le Catalogue de M. le docteur A. Puton, il prie ses collègues de vouloir bien lui adresser toutes les espèces des divers genres de ce groupe, afin d'avoir sous les yeux le plus grand nombre possible d'individus; les insectes qui lui seront communiqués devront avoir l'indication exacte du lieu où ils ont été trouvés.

— M. J.-M.-F. Bigot fait déposer sur le bureau les descriptions de trois nouveaux genres de Diptères exotiques :

1° CALLISTORHINA (Gen. nov.).

Ad Stirpem XII (Loncheina) Rondanii pertinere videtur at epistomatis villositas, oculis etiam armatis, haud perspicua. Secundum Wiedmanni, Macquarti, Walkeris vel Schineri ordinamenta, locum proprium invenire non possumus.

Facies, sub antennis, longe conica; antennis fronte insertis, segmento 3° oblongo, nec acuminato, 2° ter longiore, prope basin chætigero, chæto satis longe, sed parce totum villoso; fronte lata, macrochætis longis, sparsis,