

9. *Rhapactor biparticeps* Put.

Oblong, brillant, d'un beau noir très légèrement bleuâtre, hérissé de soies noires, bien visibles surtout sur les côtés de la tête, sur le pronotum et l'écusson, mais très courtes et peu visibles sur les élytres. Tête noire, brillante, à peu près lisse, sa partie antérieure d'un blanc d'ivoire légèrement jaunâtre jusqu'au milieu de la longueur de l'œil. Rostre et antennes noirs; le premier article des antennes grêle, aussi mince que les deux suivants, un peu moins long que la tête, le 2^e ayant à peu près le tiers de la longueur du 1^{er}, le 3^e un peu plus long que le 2^e, le 4^e manque. Pronotum noir, brillant entre les poils, trapézoïdal, sinué latéralement par le sillon transverse; lobe antérieur avec un court sillon médian et le commencement d'un autre très faible de chaque côté du médian; lobe postérieur déprimé jusqu'un peu en avant du bord postérieur, avec un sillon longitudinal large et peu profond sur ses trois quarts antérieurs; bord postérieur très faiblement sinué devant l'écusson; celui-ci court, très poilu. Élytres d'un beau rouge avec le prolongement de l'angle externe de la corie rembruni. Membrane d'un noir bleuâtre. Poitrine entièrement noire ainsi que les hanches et les trochanters. Ventre brillant, d'un blanchâtre livide, les trois derniers segments avec un gros point brunâtre sur le milieu des côtés; dernier segment avec l'extrême bord postérieur noir; une tache noire au bord postérieur de chaque segment du connexivum. Fémurs rouges avec un demi-anneau noir au milieu; genoux, tarsi et tibias noirs, ceux-ci avec un petit anneau rouge tout près de la base. — Long., 17 mill.

Tunisie méridionale, sans localité plus précise. — Des chasses de M. Letourneux.

10. *Phytocoris Chardoni* Put.

Très voisin des *Phytocoris ustulatus* H-S. et *citrinus* Bol. pour la taille, la couleur et la forme du 1^{er} article des antennes, il diffère des deux par une bande rougeâtre transverse, au bord postérieur du pronotum; il diffère de l'*ustulatus* par l'angle postérieur seul du cuneus très étroitement rouge, les fémurs marbrés de rouge comme dans le *citrinus* et non presque uniformément rouges, par la membrane moins enfumée; il se distingue en outre du *citrinus* par l'absence des deux points noirs au bord interne du