

la tête, les côtés du pronotum et des élytres. Tête d'un jaune roux avec un trait noir allant de l'œil à la base de l'antenne; un autre trait noir longitudinal sur le vertex de chaque côté de la ligne médiane; antennes noires, hérissées de soies noires, celles du 1<sup>er</sup> article pas plus fortes que celles du 2<sup>e</sup>, celui-ci cylindrique, non renflé vers l'extrémité. Yeux assez fortement pédonculés, dépassant de tout leur diamètre l'angle antérieur du pronotum. Celui-ci à côtés presque parallèles. Écusson court. Élytres très écourtées, laissant à découvert presque tout l'abdomen, un peu élargies en arrière, tronquées droit au sommet, leur bord externe d'un jaune roux sur une largeur égale au diamètre de l'œil. Abdomen très élargi; bord extrême du connexivum roussâtre à la base. Côtés de la poitrine avec une bande longitudinale flave. Pattes noires, les tibias roux à soies noires et à points noirs. ♀. — Long., 3 mill.

Découvert à Mahadid près de Bou-Saada par le D<sup>r</sup> Ch. Martin. Cette espèce voisine du *L. signatus* Fieb., mais d'une autre coloration a les yeux plus saillants, le corps un peu plus cylindrique, les soies plus fortes et plus nombreuses. Elle diffère du *L. flavolimbatus* Costa (1) par la taille plus grande, la forme moins cylindrique, les soies bien plus fortes, les yeux dirigés transversalement en dehors et non incurbés sur les angles du pronotum, etc.

### 13. *Orthotylus Martini* Put.

D'un vert très pâle, un peu grisâtre, assez brillant, à poils écailleux argentés, très fugaces. Tête, pronotum, cuneus et premier article des antennes entièrement noirs. Antennes longues et grêles, atteignant le milieu du cuneus; le premier article court, ne dépassant pas l'extrémité du clypeus, les 2<sup>e</sup> et 3<sup>e</sup> grêles, très longs et subégaux. Vertex complètement marginé. Pronotum court et large. Élytres garnies, outre les poils écailleux d'une pubescence grisâtre, extrêmement courte et fine, à peine visible. Membrane enfumée, mais en outre magnifiquement irisée, excepté dans les cellules; nervures de celles-ci grisâtres. Ailes inférieures d'un beau bleu irisé. Dessous du corps et de la tête, ainsi que les pattes, d'un flavescent verdâtre très pâle; tibias à soies blanches. — Long., 4 mill.

Biskra, des chasses du D<sup>r</sup> Martin. — Cette jolie espèce ne ressemble à aucune autre par son système de coloration.

(1) Espèce des Abruzzes, retrouvée dans les Carpathes sur le Bucoclu, à plus de 2,000 mètres, par M. Montandon.