

4. **TYTTHUS FLAVEOLUS** n. sp.:*)

Breviter ovatus (♂) vel oblongo-ovatus (♀), pallide flavus, dense longius pallide pubescens, oculis nigris, tylo antennisque corporis fere longitudine fuscis, basi apiceque articuli primi basique secundi et tertii anguste pallide flavis, articulo secundo subaequali; pronoto ad basin fere capitis latitudine, hemelytris abdomine brevioribus, pellucidis, apice oblique truncatis, angulis rotundatis; membrana alisque nullis.

Mas: breviter ovatus, hemelytris tantum segmentum ultimum abdominis haud tegentibus, hoc magno, valde convexo, fere $\frac{1}{3}$ totius abdominis longitudinis occupanti, apice semicirculariter emarginato. Long. $2\frac{1}{2}$ mm.

Femina: oblongo-ovatus, hemelytris segmenta 4 ultima abdominis haud tegentibus, his simul sumptis fere dimidium abdominis occupantibus, segmento ultimo parvo, convexiusculo, margine postico segmenti penultimi semicirculariter sinuato. Long. $3\frac{1}{4}$ mm.

På våta ängar har jag vid Lofsdal, Dirfall, på Lenholmen och på Ålön funnit fyra ♂ och en ♀ af denna säregna art; alla i Augusti månad. (Tagen i Sverige af Doktor Haglund.)

Species colore structuraque distinctissima. Caput longitudine latius, infra oculos in angulum obtusiozem productum, pallide flavum, dense longius pubescens, apice tyli vel tylo toto fusco; rostro coxas intermedias fere superanti. Oculi convexiusculi, nigri. Antennae corporis fere longitudine, fuscae, basi apiceque articuli primi basi que articularum secundi et tertii anguste pallide flavis, articulis ultimis pallidulentibus; articulo primo fere obconico, secundo primo triplo et tertio dimidio longiore, articulo quarto tertio longitudine aequali. Pronotum lateribus posterius sensim ampliatum, postice longitudine circa $\frac{1}{3}$ latius ibique capitis fere latitudine, angulis posticis parum prominentibus, obtusis, marginē po-

*) *T. insignis* Dougl. et Scott (the Entomol. Monthly Magazine, April 1866, p. 247, 1) *T. flaveolo* simillimus videtur. An forma hujus macroptera?