

Båda varieteterna äro tagna af förf. på *Fraxinus* vid Strömstad. Äfven funnen i Östergötland af HAGLUND.

*15. *Ps. albicinctus* KIRSCHB., FIEB., Eur. Hem. p. 307, 5.

Denna af förf. vid Köpenhamn tagna art förekommer helt säkert äfven i Skånes bokskogar.

*16. *Ps. diminutus* KIRSCHB., FIEB., Eur. Hem. p. 309, 16.

På *Quercus* i södra och mellersta Sverige, flerstädes troligen ej sällsynt.

*17. *Ps. varians* H.-SCH., FIEB., Eur. Hem. p. 309, 14.

Funnen vid Stockholm, i Blekinge, Östergötland, Småland och Skåne samt på Gotland af BOHEMAN. Lefver på *Quercus*.

*18. *Ps. lapponicus* n. sp. Oblongus (σ^{\prime}) vel oblongo-ovatus (φ) permodice nitidus, capite pronotoque opacis, sublævis, supra dilute brunneus vel rufo-brunnescens, subtus brunnescens vel dilute roseus; supra subtiliter fulvo-pubescent; antennis lutescentibus, pilosulis; corio margine apicali angustissime albido; cuneo apice concōlore, basi sat late pallido; membrana dilute fumata, venis rufescētibus, macula majore sub apice cunei hyalina postice dilute fusco-umbrata notata; pedibus albidis, femoribus sat parce et subtiliter fusco-rufo- vel fusco-punctatis, posticis incrassatis, tibiarum spinis nigris ex punctis fuscis nascentibus; capite magno, crasso. Long. 4 $\frac{1}{4}$ m.m.

Mas. Segmento ultimo ventrali infra carinato.

Femina: Vagina basin abdominis fere attingente.

Två exemplar (σ^{\prime} , φ) äro tagna i mellersta Lappland af BOHEMAN.

Species inter congeneres magna et insignis. *Ps. variantis* H.-SCH. var. *nigricanti* FIEB. haud dissimilis, capite majore, inter oculos distincte latiore, antennis pilosulis, capite pronotoque sub-opacis distinguenda. Corpus oblongum (σ^{\prime}) vel oblongo-ovatum (φ), supra pilis aureolis pubescens, subtus subtiliter albido-pubescent. Caput sat magnum, basi longitudine latius, brunnescens vel rufescens, opacum. Oculi sat magni, nigro-rufi; spatium interoculare latitudine oculi paullo plus duplo (σ^{\prime}) vel plus duplo et dimidio (φ) latius; apud *Ps. variantem*, cuius oculi maris majores et magis prominentes, vix dimidio (σ^{\prime}) vel duplo (φ) latius. Antennæ lutescentes, pilosulæ, corporis dimidio longiores, articulo secundo maris paullo crassiore, tertio secundo circiter $\frac{1}{3}$ breviore, quarto tertio circiter duplo breviore. Rostrum longum medium ventris superans (σ^{\prime}) vel attingens (φ), luteum, apice picescēte. Pronotum trapezoidale, margine antico longitudine subæquilatum, margine postico recto longitudine duplo latius, brunnescens vel antice luteo-rufescens, opacum. Heme-lytra brunnescētia, nitidiuscula, margine apicali corii angustissime albido, corio margine laterali cuneo triplo longiore. Cuneus, membrana et pedes supra in diagnosi descripta. Tarsi apice fusi.

*19. *Agalliastes pullus* REUT., Not. ur Skpts pro F. et Fl. F. Förh. XI p. 224, 5.

Funnen vid Stockholm af STÅL och vid Strömstad af förf.