

20. *Ag. pinetellus* ZETT., Ins. Lapp. p. 276, 30 (*Phytocoris* sec. spec. typ.). *Capsus pinetellus* KIRSCHB., Rhynch. Wiesb. p. 76, 90. FLOR, Rhynch. Livl. I p. 586, 69. *Agalliastes lugubris* FIEB., Eur. Hem. p. 312, 10 ♂. *Plagiognathus pallidipennis* J. SAHLB., Not. Skpts pro F. et Pl. F. Förh. IX p. 178, 101 ♀.

På barrträd i Skåne, på Gotland, vid Stockholm och i Lappland.

21. *Ag. impurus* BOH., Ö. V. A. F. 1852 p. 69, 24 (*Phytocoris*) REUT., Not. Skpts pro F. et Pl. F. Förh. XIV p. 22, 39.

Funnen af BOHEMAN i Skåne och på Gotland.

*22. *Timicephalus obsoletus* DOUGL. et SCOTT, Brit. Hem. p. 391, 1 (forte). Oblongus, virescenti-luridus, subtiliter pallido-pubescentis; oculis apiceque rostri nigris, tarsis apice fuscis; membrana dilute infuscata, iridescente, venis luridis, areolis pallidis. Long. $4\frac{2}{3}$ m.m.

Femina: Vagina medium abdominis attingente.

Funnen i Östergötland af HAGLUND.

Corpus oblongum, pallido-pubescentis. Caput 5-angulare, subtiliter pallido-hirsutulatum, luridum, breve, basi longitudine fere dimidio latius, vertice haud carinato, fronte convexa; tylo utrinque æquilato, a fronte linea impressa distincte discreto, basi in linea media interoculari sita; gula brevi. Oculi sat magni, rotundati, lateribus capitibus parum breviores, margine interiore apicem versus paullo divergentes, nigri; intervallum oculorum latitudine oculi fere $2\frac{1}{2}$ latius (♀). Antennæ prope marginem oculorum interiorum inferne insertæ, luridæ, $\frac{2}{3}$ corporis longitudine, articulo primo dimidii capitibus longitudine, secundo hoc quadruplo longiore, lineari, duobus ultimis simul sumtis æquilongis, tertio quarto plus duplo longiore. Rostrum coxas posticas vix attingens, virescenti-luridum, apice summo nigro, articulo primo crassiore capite paullo superante. Pronotum breviter trapezoidale, flavo-luridum, subtiliter pallido-pubescentis, margine antico recto longitudine sub-æquilatum, margine postico leviter rotundato quam apice circiter $\frac{2}{3}$ latius, lateribus rectis (♀). Hemelytra lurida, satis pellucida, sat nitida, subtiliter pallido-pubescentia, abdomen fere $\frac{1}{4}$ longitudinis superantia, basi pronoti $3\frac{2}{3}$ longiora, margine exteriori leviter rotundata, cuneo basi paullo longiore. Membrana leviter infuscata, iridescentis, areolis pallidioribus, venis luridis. Pedes dilute luridi vel virescentes, coxis posticis epipleura hemelytrorum haud attingentibus, femoribus posticis breviusculis, sat robustis, tibiis omnibus longius pallido-spinosis, aroliis sat magnis, subparallelis. Abdomen leviter fuscens vel luridum, vagina femine medium attingente.

*23. *Oncotylus pulchellus* n. sp. Ovalis, totus flavo-luteus, tantum oculis et apice tarsorum brunneis; supra nigro-pilosus parciusque albo-tomentoso-pubescentis; membrana leviter infuscata, macula parva sub apice cunei hyalino-albida, venis areolisque pulchre flavis (♀). Long. $3\frac{1}{2}$ m.m.

Funnen vid Stockholm af BOHEMAN.