

- angulari. Arolia magna, apice divaricata. Mas segmento genitali subtus carinato. LOPARIA REUT.
- 9(6). Pronotum lateribus antice rarissime marginatis vel acutis, in hoc casu autem pronotum strictura apicali nulla et alæ hamo instructæ.
- 10(15). Hemelytra furca cubiti completa vel subcompleta. Pronotum apice strictura annuliformi instructum. Alæ hamo nullo.
- 11(12). Antennæ infra apicem oculorum insertæ. Pronotum callis crassis latera superantibus. Arolia parva. DYONCARIA REUT.
- 12(11). Antennæ ad oculos interne insertæ, magis quam oculi superne distantes. Pronotum callis latera haud superantibus. Arolia magna, apice divaricata.
- 13(14). Hemelytra vena brachiali distincta, cuneo elongato-triangulari. Pronotum sat obsolete punctatum, interdum transversim rugosum. Mas segmento genitali subtus plerumque carinato. PHYTCORARIA REUT.
- 14(13). Hemelytra vena brachiali rarissime discreta, cuneo breviusculo, fractura sæpe profunda. Pronotum callis discretis, disco postice distincte, sæpe fortiter punctato. CAPSARIA REUT.
- 15(10). Hemelytra furca cubiti rarissime completa, in hoc casu autem pronotum strictura apicali annuliformi nulla. Antennæ haud vel vix magis quam oculi superne distantes. Species sæpe pterygo-dimorphæ.
- 16(17). Hemelytra vena cubitali ultra medium profunde impressa, deinde abrupta. Tarsi articulo ultimo incrassato. Membrana uniareolata, areola ovali. BRYOCORARIA REUT.
- 17(16). Hemelytra vena cubitali haud profunde impressa. Tarsi articulo ultimo haud incrassato. Membrana plerumque biareolata.
- 18(19). Pronotum apice interdum strictura annuliformi instructum. Alæ rarissime hamo instructæ, in hoc casu autem pronotum strictura apicali instructum vel oculi postice pronoto incumbentes. CYLLOCORARIA REUT.