

T. anthocorooides REUT. n. sp. Nigro-fusca, opaca, subtiliter pallidopubescens. Antennæ articulo secundo apice late albo. Pronotum setis rigidis lateralibus fuscis. Hemelytra basi sat late rubido-alba. Corium macula apicali externa nivea. Membrana tota fusca. Coxæ, femora apice, tibiæ tarsiique testacea. Long. $3\frac{1}{3}$ m.m. Gallia (Rouen), D. PUTON. Forsitan e Senegal navi importata.

Divisio MIRARIA REUT.

Conspectus generum.

- 1(10). Tarsi articulo primo secundo multo longiore, subtus tomentoso.
- 2(3). Vertex sulco tenui longitudinali destitutus, pone oculos transversim sat fortiter impressus. Pronotum lateribus late reflexolimbatis, disco medio carina percurrente longitudinali instructum. Frons supra clypeum producta. Gen. 1. **Acetropis** FIEB.
- 3(2). Vertex sulco longitudinali distincto. Pronotum lateribus haud limbatis. Frons sæpe supra clypeum producta.
- 4(5). Pronotum margine basali truncatum, disco crebre, concinne, sat fortiter punctatum, basin scutelli obtegens. Scutellum distincte punctatum. Gen. 2 **Miris** F., REUT.
 - A. Femora postica subtus ante apicem dentibus duabus, posteriore longiore, armata. Caput fere transversum, angulo faciali sub-obtuso. Frons producta clypeum haud superans. Subg. 1 **Brachytropis** FIEB.
 - AA. Femora postica inermia. Subg. 2 **Miris** F., REUT. (= *Lobostethus* FIEB. et *Miris* FIEB.)
- 5(4). Pronotum margine basali distincte sinuato, apice sæpe strictura annuliformi obsoleta instructo, disco obsolete punctato. Scutellum lave, basi libera.
- 6(7). Caput latitudine distincte, plerumque multo, longius. Oculi angulos pronoti attingentes. Gen. 3 **Megalo-ceræa** FIEB., REUT.
 - A. Tibiæ longe pilosæ, spinulis nullis. Antennæ corpore paullo longiores, articulo primo longe