

punctatæ, sed nigro-spinulosæ. Dorsum abdominis nigrum. Antennæ breviusculæ, corpore dimidio tantum paullo longiores, articulo secundo pronoti basi breviore. *L. pratensis* L. (+ *L. campestris* L. et *L. punctatus* ZETT.)

AA. Antennæ breves, dimidio corpore haud vel parum longiores, articulo secundo pronoti latitudine basali breviore, crassiusculo. Rostrum coxas intermedias attingens vel nonnihil superans. Hemelytra fortiter punctata. Dorsum abdominis nigrum. Femora apice plerumqve nigro- vel fusco-biannulata. Tibiæ impunctatæ, anticæ muticæ. Vinctus in Umbellatis. Subg. 3. *Orthops* FIEB. Contpectus specierum mihi cognitarum:

a. Cuneus testaceus, apice nigro. Antennæ articulo secundo ultimis simul sumtis distinete longiore. *L. (O.) Kalmi* L. (+ *flavovarius* F.) et *L. (O.) conspurcatus* REUT. n. sp.

L. (O.) conspurcatus REUT. n. sp.: Caput basi pronoti vix duplo angustius, testaceum, lineis transversis margineqve elevato verticis fulvis. Pronotum fortiter et sat dense punctatum, testaceum, limbo basali, ipso margine excepto, sat anguste nigro-fusco. Scutellum nigro-piceum, vittis tribus longitudinalibus apiceqve testaceis. Hemelytra sat subtiliter punctata, testacea, margine scutelları apiceqve piceis. Corium apicem versus piceo-conspurcatum. Cuneus apice piceo. Dorsum abdominis apicem versus picescens. Pectus testaceo- et ferrugineo-variegatum. Long. tantum $2\frac{3}{4}$ m.m. (Specimen descriptum mutilatum, antennis pedibusqve destitutum). ♂ fronte oculo maximo angustiore. Habitat in Biskra Algériæ, D. LETHIERRY.

aa. Cuneus viridis, apice sæpe anguste obscuriore. Antennæ articulo secundo ultimis simul sumtis æqvilongo.

b. Membrana fusco-notata. *L. (O.) pellucidus* FIEB.

bb. Membrana fere tota innotata. *L. (O.) transversalis* F. (= *Pastinacæ* FALL.)