

- culi validi, ad medium usque dentato-dilatati, dein subito tenues. Gen. 8. **Deraëocoris** KIRSCHB., STÅL (= *Capsus* FIEB.)
- 15(2). Tarsi articulo primo secundo duplo vel fere duplo longiore. Tibiæ haud spinulosæ. Pedes pilosi. Antennæ articulo primo apicem clypei haud vel vix attingente. Corpus saltem supra longius molliter pilosum.
- 16(17). Tarsi breves, articulo ultimo duobus primis latiore et his simul sumtis æqvilongo. Scutellum postice crista magna, alta, compressa, triangulari instructum. Pronotum strictura apicali annuliformi lata, remote pilosa, haud tomentoso-pubescenti. Caput breve, transversum, verticale. Oculi exserti a pronoto longe distantes. Antennæ articulo secundo apicem versus leviter incrassato, ultimis brevissimis, simul sumtis secundo plus quam dimidio brevioribus. Membrana glabra. Gen. 9. **Stethoconus** FIEB. (= *Acropelta* MELLA).
- 17(16). Tarsi articulo ultimo magis minusve angusto. Scutellum muticum. Pronotum strictura apicali dense tomentoso-pubescente.
- 18(19). Caput breve, transversum, verticale. Oculi exserti, a pronoto longe distantes. Antennæ articulo secundo crassiusculo, ubiqve fere æqvocrasso. Hemelytra furca cubiti incompleta. Membrana pilosa. Femina pterygo-dimorpha. Gen. 10. **Bothynotus** FIEB. (= *Trichymenus* REUT.).
- 19(18). Caput haud transversum, fere porrectum. Oculi a pronoto parum distantes. Antennæ articulo secundo apicem versus (præsertim ♂) sensim minus fortiter incrassato. Hemelytra furca cubiti completa. Membrana glabra. Gen. 11. **Allæotomus** FIEB.
- 20(1). Antennæ articulo secundo a medio subito clavato-incrassato. Caput latum, vertice immarginato. Tibiæ spinulosæ. Gen. 12. **Capsus** F., STÅL. (= *Rhopalotomus* FIEB.)

Divisio BRYOCORARIA REUT.

- 1(2). Rostrum crassum, apicem mesosterni fere attingens, articulo primo capite fere brevior. Pronotum for-