

bb. Membrana nigricans, iridescentia, vena brachiali vel areolæ majoris grisea, areolis haud coloratis. Tibiæ spinis nigris, sat validis. *O. (M.) chloropterus* KIRSCHB. (= *Pachylops chloropterus* FIEB.; ♂ = *Litosoma bicolor* DOUGL. et Sc.)

- BB.* Caput latum. Vertex marginatus. Pronotum breve, basi quam longitudine plus duplo lato, lateribus apicem versus leviter angustatis. Antennæ articulo primo clypeum parum superante, articulo secundo hoc fere quadruplo longiore. Rostrum coxas posticas attingens. Femora postica maris nonnihil, feminæ magis incrassata. Corpus supra plerumque nigro-pilosum, pilis aliis depressis albis parce pubescens. Subg. 3. *Allocotus* FIEB. et PUT. Conspectus specierum:
- a.* Supra nigro-pilosuli pilisque brevibus albidis vel albis, fere micantibus, depressis parce pubescens.
 - b.* Membrana feminæ brevis, margine externo cunei haud longiore, areolis angustis, dilute fumata, venis areolisque dilute virescentibus. Hemelytra margine externo valde curvato. Cuneus brevis latitudine multo brevior. Breviter ovatus, prasinus, dorso abdominis fusco. Caput pronoti basi vix magis quam $\frac{1}{3}$ angustius, Vertex distinctissime marginatus, feminæ oculo triplo latior. Pronotum breve, basi longitudine magis quam duplo latius. Antennæ corpore dimidio nullo longiores, virescentes. Pedes virescentes, tibiis spinulis concoloribus. ♀. Long. 3 m.m. Habitat in Biskra Algeriae, D. LETHIERRY. — *O. (A.) curvipennis* REUT. n. sp. (Mus. LETH.)
 - bb.* Membrana feminæ haud abbreviata. Hemelytra margine externo haud fortiter excurvata.
 - c.* Flavescens, abdomine virescente. Caput basi pronoti circiter $\frac{1}{3}$ angustius. Vertex obsoletius marginatus. Frons feminæ oculo