

- circiter duplo et dimidio latior. Embolium et cuneus apice latius fuscescentia. Membrana fere hyalina, venis pallidis. Dorsum abdominis virescens. Tibiæ longius fuscescenti-spinulosæ. ♀. Long.  $2\frac{2}{3}$  m.m. Habitat in Biskra Algeriæ, D. LETHIERRY. *O.*
- √ (A.) *Lethierryi* REUT. n. sp. (Mus. LETH.)
- cc. Supra fuscescenti-rufus. Membrana tota fumata. Antennæ et tibiæ nigricante-pubescentes. *O.* (A.) *rubidus* FIEB. et PUT.
- aa. Tantum parce, subtilissime albopubescens, pilis nigris nullis. Virescentiflavus totus. Membrana dilute infuscata, venis areolisque flavescentibus, antennis corpore longioribus. Long.  $2\frac{1}{2}$  m.m. Habitat in Gallia in Salsola (La Nouvelle, Aude, Cette, Hérault), D. D. LETHIERRY et PUTON. *O.* (A.) *Salsolæ* REUT. n. sp. (Mus. LETH., PUT. et REUT.)
- AA. Rostrum coxas posticas superans. Antennæ articulo primo clypeum parum (♂) vel haud (♀) superantè. Mucro prostethii convexiusculus, lateribus tantum basi marginatis, disco foveolato. Pedes saltatorii, femoribus posticis præsertim feminae incrassatis. Corpus supra nigro-pilosum. Subg. 4. *Litocoris* FIEB.
- 60(55). Antennæ articulo primo crasso articuloque secundo magno dilatato-compresso pilosis; articulis ultimis tenibus æqvilongis, simul sumtis articulo secundo duplo brevioribus. Vertex postice obsolete marginatus. Oculi magni, granulati. Rostrum coxas posticas superans, articulo primo crasso, caput nonnihil superante. Gen. 31. **Heterotoma** FIEB.

---

Divisio ONCOTYLARIA REUT.

- 1(8). Mucro prostethii planus vel convexiusculus, lateribus haud marginatis.