

dine fere duplo latius. Hemelytra punctis densissimis fuscis conspersa, corio saepe vitta longitudinali dilute fusca cum margine externo parallela notata. Femora apicem versus atomis fuscis minutissimis conspurcata. Tibiae spinulis fuscis e punctis minutis fuscis nascentibus. Femina: terebra medium ventris attingente, fronte oculo vix duplo latiore. ♀. Long.  $3\frac{1}{3}$ — $3\frac{1}{2}$  m.m. Habitat in Gallia (La Nouvelle, Aude) in Salsola m. Junii, D. D. PUTON et LETHIERRY. *O. Putonii* REUT. n. sp. (Mus. PUT. et REUT.)

- aa.* Corpus supra nigro-pubescent vel nigro-pilosum.
- c.* Femora haud nigro-punctata.
- d.* Tibiae parce et subtiliter pallido-spinulosæ. Læte ochraceus, supra nigro-pilosus. Vertex fere marginatus. Membrana vix infuscata, venis areolisque totis pulchre ochraceis. Apex antennarum, rostri, tibiarum et tarsorum niger. Tibiae parce et subtiliter pallido-spinulosæ. *O. pulchellus* REUT.
- dd.* Tibiae nigro-spinulosæ.
- e.* Membrana areolis totis flavis vel hyalinis, macula crocea notatis, venis aurantiacis vel croceis, extus aurantiaco- vel croceo-marginatis.
- f.* Membrana infuscata macula magna pone areolas nigricante, areolis pallide flavis, venis aurantiacis. Aurantiacus, subtiliter nigri-conti-pilosus et pallido-pubescent. *O. fennestratus* FIEB.
- ff.* Membrana dilute infuscata, areolis hyalinis, macula crocea notatis, venis croceis, extus croceo-marginatis; pone apicem cunei macula trianguli pellucida. Viridi-flavus, dense nigro-hirsutus, oculis virescentibus. Vertex immarginatus. Antennæ adpressim nigropubescentes, articulis duobus ultimis obscurioribus. Rostrum apice nigro. Pro-