

longa. Antennæ articulo secundo, incrassato, feminae crassiore, sæpe fusiformi. Rostrum longum. Cuneus fractura sæpe profunda. Mesosternum postice convexum. Mas segmento genitali subtus mutico. Femina terebra brevi, medium ventris parum superante.

Gen. 6. **Atractotomus** FIEB.

*Atractotomus fuscinervis* REUT. n. sp. ♂: Niger vel piceo-viger, nitidus, pilis cupreis fragilibus sat dense vestitus. Antennæ articulis primis duobus nigris, secundo primo fere quadruplo longiore, mox ante basin leviter fusiformiter incrassato. Hemelytra picea, cuneo toto concolore; membrana infuscata, venis areolisque fuscis, tantum pone cuneum macula parva apicem areolæ minoris attingente pellucida, albida. Femora picea, anteriora apice late testacea. Tibiæ nigrospinulosæ, anteriores testaceæ, apice picescentes, posticæ ferrugineæ, apicem versus obscurioræ. Tarsi picescentes. ♂. Long.  $3\frac{1}{4}$ — $3\frac{1}{3}$  m.m. Habitat in Corsica, D. PUTON. (Mus. PUT.)

*Atractotomus apicalis* REUT. n. sp. ♀. Niger, nitidus, pilis fragilibus cupreis vestitus. Antennæ articulis duobus primis nigris, secundo primo paullo magis quam quadruplo longiore, fusiformi, breviter nigro-pilosulo, ultimis albidis. Hemelytra nigropicea, corio margine apicali extus lineariter albo, cuneo apice albo; membrana infuscata, venis fuscis, vena externa tota areolæ minoris venaque marginali areolæ majoris (= vena brachiali) apice albis, areola majori magis minusve pellucida, pone apicem cunei macula triangulari hyalino-albida apicem areolæ majoris attingente notata. Femora omnia picea, postica nigro-picea. Tibiæ obscure testaceæ, nigrospinulosæ. Tarsi testacei, articulo-tertio fusco. Long.  $2\frac{1}{3}$  m.m. Habitat in Austria, Laibach ad Grosskahlenberg m. Maji, D. A. PALMÉN. (Mus. Hel-singfors.)

- 14(13). Antennæ articulo secundo maris plerumque nonnihil incrassato, feminae tenui. Rostrum longum. Gen. 7. **Psallus** FIEB., REUT.

A. Gula distincta, feminae brevior. Femora postica minus fortiter incrassata. Species nigricantes vel