

- ff.* Parvus. Cuneus nigro-piceus, basi lunula rufo-picea, raro totus sanguineus. Membrana venis flavis, areolis nigricantibus. *Ps. (A.) graminicola* ZETT.
- bb.* Antennæ totæ luteæ vel testaceæ. Femora postica modice incrassata.
- g.* Saltim caput, pronotum et corpus subtus nigra.
- h.* Pilis fragilibus albidis pubescentes vel squamosæ.
- i.* Supra pilis longioribus albidis fragilibus sat dense pubescens. Antennæ obscure testaceæ, articulo secundo duobus ultimis conjunctim paullo breviore, quarto tertio circiter duplo breviore. Hemelytra testacea, clavo toto, corio marginibus omnibus exceptis cuneoqve basi lata excepto fuscis; membrana infuscata, venis areolarum infuscatarum testaceis, pone apicem cunei macula triangulari vel obcordata angulum areolæ majoris attingente albido-hyalina; medio membranæ magis pellucido, limbo externo obscuriore. Pedes testacei. Femora parce fusco-guttulata, guttulis subtus fere triseratis. Tibiæ fusco-punctatae et nigro-spinulosæ, spinulis sat longis et validis. ♀ fronte oculo circiter duplo latiore. Long. 4 m.m. Habitat in frondibus Pini Laricis ad Zinal Helvetiæ (5500") et in Graubündten (1500"), D. FREY-GESSNER. *Ps. (A.) Laricis* REUT. (= *Brachyarthrum Laricis* FREY-GESSNER in litt.)
- ii.* Supra dense albo-squamulosus. Antennæ plerumqve articulo primo nigro, cetero sordide testaceæ. Hemelytra tota nigra, tantum ima basi corii testacea, cuneo toto nigro. Pedes sordide-testacei, femoribus plerumqve infuscatis. Mas segmento genitali subtus mutico. *Ps. (A.) obscurellus* FALL. (= *Capsus pityophilus* FLOR et *Atractotomus Pini* DOUGL. et Sc. — Varietas antennis articulo