

- tata. Pedes testacei, femoribus parce et subtiliter fusco-guttulatis, tibiis spinulis pallidis e punctis fuscis nascentibus. Femina fronte oculo paullo magis quam duplo latiore. *Ps. roseo* sat similis, sed minor, clavo et corio unicoloribus, femoribus parum fuscopunctatis, tibiis pallido-spinulosis, antennis totis testaceis nec non victu in arboribus frondosis distinguendus. Long. ♀ $2\frac{3}{4}$ —3 m.m. Habitat in *Pino* Galliae, D. PUTON. *Ps. (Ps.) pinicola* REUT. (Mus. PUT.)
- bb.* Cuneus fuscescens, fuliginosus vel aurantiacus. Species supra fuliginosæ vel flavotestaceæ, sæpissime aurantiaco-notatæ.
- g.* Majores. Species supra fusciscentes vel fuliginosæ, interdum flavotestaceæ, in hoc casu antennæ articulo tertio feminae quarto saltem duplo longiore.
- h.* Antennæ articulo quarto tertio magis quam $\frac{1}{8}$ brevior, sed haud duplo brevior. Fuscus. Pronotum dense nigroguttulosum. Antennæ fuscotestaceæ, articulo secundo maris incrassato et ultimis duobus simul sumtis fere duplo longiore. Cuneus apice concolore, basi albido-pellucida. Membrana infusca, venis albidis, areola minore nigricante, majore pellucida tantum apicem versus fusca; macula pone cuneum aliaque marginis externi albidis, inter has obscure fusca. Pedes testacei. Femora dense fusco-guttulosa. Tibiæ nigropunctatæ et spinulosæ. Mas hemelytris lateribus parallelis, dorsum longe superantibus, fronte oculo nonnihil latiore. ♂. Long. $4\frac{1}{6}$ m.m. Habitat in Hispania, D. PUTON. *Ps. puncticollis* FIEB., REUT. (= *Liops puncticollis* FIEB. sec. spec. typic.)
- hh.* Antennæ articulo tertio feminae quarto saltem duplo longiore. Pronotum atomis nigris nullis.