

- infuscata. Tibiæ nigro-spinulosæ. Tarsi apice nigri. Dorsum abdominis nigrum. ♂. Long. $2\frac{1}{3}$ m.m. Habitat in Biskra Algeriæ, D. LETHIERRY. (Mus. LETH.)
- 19(18). Tarsi postici articulo tertio duobus primis simul sumtis brevior.
- 20(21). Peristomium et gula in eodem plano posita. Genæ latæ. Rostrum coxas posticas superans, articulo primo dimidium mucronis attingente. Gen. 10. **Tinicephalus** FIEB.
- 21(20). Gula obliqua vel brevissima, haud conspicua. Oculi læves. Gen. 11. **Plagiognathus** FIEB., REUT.
- A. Antennæ maris et feminae structura coloreque dissimilis, maris articulo secundo fortius incrassato. Tibiæ nigro-spinulosæ, raro autem nigropunctatæ. Corpus supra pilis fragilibus, pallidopubescentibus et nigro- vel fusco-pilosum.
- B. Antennæ articulo secundo maris fortiter incrassato, articulo primo clypeum nonnihil superante. Corpus supra pilis fragilibus pallidis vel aureis aliisque nigris vel fuscis pubescens. Mas segmento genitali subtus medico. Femina terebra brevi. Subg. 1. *Criocoris* FIEB.
- Criocoris fulvus* REUT. n. sp. Fulvus, supra sat dense nigro-pilosus et subtiliter pallidopubescentibus. Antennæ maris nigrae, articulo ultimo apice ferrugineo, articulo secundo sat fortiter incrassato et duobus ultimis simul sumtis æquivalongo. Frons maris oculo $\frac{5}{6}$ latior. Femora apice guttis nonnullis marginalibus majoribus nigris. Tibiæ spinis nigris ex punctis nigris nascentibus. Pectus fusco-variegatum. Abdomen nigro-fuscum, marginibus segmentorum fulvis. ♂. Long. $2\frac{1}{3}$ m.m. Habitat in Gallia, a D. SAUNDERS lectus (Mus. SAUND., PUT. et REUT.)
- BB. Antennæ longæ, corporis longitudine vel hoc longiores, articulo secundo maris incrassato, articulo primo clypeum longe superante. Rostrum coxas intermedias fere attingens. Corpus supra subtiliter pallidopubescentibus, pilis nigris fragili-