

- cali nigris. Mas et femina discolores. *Pl. viridulus* FALL.
- bb.* Corpus supra pallido-pubescentia.
- e.* Supra subtilissime albido-pubescentia, caput et pronotum fere glabra. ♂. Oblongus, piceus vel nigropiceus, nitidus. Vertex margine postico concolor. Frons oculo fere duplo latior. Antennæ articulo primo nigro, secundo nigro-fusco vel apicem versus pallidiori. Hemelytra picea vel nigropicea, unicolora, tantum apice cuneo paullo dilutiore. Membrana nigricans, tantum vena externa areolæ minoris maculaque pone cuneum apicem areolæ minoris attingente hyalino-albidis. Pedes cum coxis ochracei. Femora elongata, parce et obsolete nigro- vel fusco-guttata. Tibiæ e punctis nigrofusca minus dense nigrospinulosæ, apice fuscae. Long. $3\frac{1}{3}$ — $3\frac{1}{2}$ mm. Habitat in Corsica, D. PUTON. *Pl. flavipes* REUT. n. sp. (Mus. PUT. et REUT.)
- ee.* Supra pilis albidis longioribus fragilibus vestitus. Cuneus saltim basi albidus. Femora saepe nigra, tantum apice testacea. *Pl. albipennis* FALL.
- GG.* Femora postica sat fortiter incrassata. Tibiæ basi pallidæ. Gula brevissima. Antennæ articulo secundo interdum brevi. Subg. 6. *Atomascelis* REUT, (Ad hoc subgenus sunt referendi: *Agalliaestes Verbasci* H. SCH., FIEB., *A. onustus* FIEB. et verisimiliter etiam *A. punctatus* FIEB.)
- A. concinnus* REUT. n. sp.: Parvus et gracilis, subitus virescens, limbo abdominis latius pallido. Caput flavovirescens. Antennæ corporis dimidio longiores, articulo secundo duobus ultimis conjunctim æqvilongis et latitudine pronoti basali longitudine æqvali. Pronotum et scutellum viridia. Hemelytra albida, guttis saturate viridibus hinc inde conspersis, præsertim in clavo, in medio et circa apicem corii collo-