

gropunctatæ et spinulosi. Tarsi apice fuscii. ♀. Long. $3\frac{1}{3}$ m.m. Habitat in Gallia, Dunquerque, D. PUTON. *Pl. (N.) Puttonii* FIEB. (Mus. PUT. et REUT.)

bb. Vertex ad oculos utrinque macula parva lutea notatus. Pronotum, scutellum et hemelytra tota nigra, innotata. *Pl. (N.) nigritulus* ZETT. (= *Agalliastes nigritulus* ZETT., FIEB.)

EE. Antennæ articulo secundo capitis basi æquilongum vel brevius. Caput latum, basi pronoti haud vel tantum $\frac{1}{5}$ — $\frac{1}{6}$ angustius. Frons nitida, valde convexa, gibbosa. Gula brevissima. Femina terebra medium ventris haud vel vix attingente. Victus inter herbas locis aridis. Subg. 8. *Agalliastes* FIEB., REUT. (= *Agalliastes* FIEB. partim). Conspectus specierum mihi cognitarum:

- a. Hemelytra haud abbreviata, abdomine saltem paullo longiora. Tibiæ nigro-punctatæ et nigro-spinulosæ.
- b. Major, latior. Mas articulo secundo antennarum apicem versus albido. *Pl. (A.) pulicarius* FALL.
- bb. Minor, gracilior. Mas articulo secundo antennarum toto nigro. *Pl. (A.) pullus* REUT.
- aa. Dimorphæ. Hemelytra formæ brachypteræ raro abdominis longitudine. Tibiæ nigro-spinulosæ, sed haud nigro-punctatæ.
- c. Cuneus distincte discretus. Membrana semper discreta, formæ brachypteræ parva, anum fere attingens. *Pl. (A.) signatus* J. SAHLB. (= *Capsus opacus* ZETT. partim (♀)).
- cc. Clavus et cuneus a corio haud discreti. Membrana angustissima, linearis vel nulla. Hemelytra formæ brachypteræ dimidium dorsi haud vel parum superantia. Antennæ articulo secundo crassiusculo.
- d. Hemelytra basi pallida. Supra subtiliter flavicanti-pubescentia. *Pl. (A.) saltitans* FALL.