

- dd.* Hemelytra tota nigra.
e. Niger, nitidus. Tantum hemelytra opacula subtilissime parcius flavicanti-pubescentia. *Pl. (A.) Wilkinsoni* DOUGL. et Sc.
ee. Niger, opacus, undiqve pube depressa longiore pallido-cinerea dense vestitus. *Pl. (A.) evanescens* BOH.

22(3). Pronotum margine apicali profunde emarginato, disco antrorsum valde convexo-declive, callis distantibus. Membrana uniareolata. Corpus convexum. Caput nutans, triangulare, apice rostrato-productum, cum oculis longitudine fere æquilatum. Vertex parum latus, margine postico haud acuto. Frons valde declivis. Oculi oblongi. Antennæ tenues, corpore fere longiores, ad marginem oculorum interiorem inferne insertæ, articulo primo clypeum haud superanti, articulo secundo duobus ultimis simul sumtis æquilongo, quarto tertio fere duplo brevior. Rostrum coxas medias attingens, articulo primo caput paullo superante. Scutellum basi obtectum. Femora postica valde incrassata. Tibiæ spinulosæ. Gen. 6. **Colpochilus** REUT n. g.

C. tenuicornis REUT. n. sp.: Niger, nitidus, glaber, antennis, apice femorum, tibiis tarsisque flavo-testaceis, articulo primo antennarum subtus sat late, tibiis tarsisque apice anguste nigris; tibiis spinis fuscis. Corium margine apicali anguste testaceo. Cuneus ipso apice testaceo. Femina fronte oculo circiter triplo latiore hemelytrisqve abdomini æquilon-gis. Long. $3\frac{1}{3}$ m.m. Gallia (Alsace). D. PUTON. (Mus. PUT.)

Divisio ISOMETOPARIA REUT.

- 1(2). Rostrum fere corporis longitudine. Antennæ articulo primo minutissimo, secundo cylindrico, longo, tertio hoc circiter quadruplo brevior et multo angustior, ultimo parvo fusiformi. Gen. 1. **Myiomma** PUT.