

PETITES NOUVELLES ENTOMOLOGIQUES

Paraissant le 1^{er} et le 15 de chaque mois

ABONNEMENT ANNUEL :

| | |
|-------------------------------|---------|
| France et Algérie..... | 4 fr. » |
| Belgique, Suisse, Italie..... | 5 » |
| Tous les autres pays..... | 6 » |

(AFFRANCHISSEMENT COMPRIS).

ADRESSER LE MONTANT DES ABONNEMENTS

Et tout ce qui est relatif à la Rédaction et à l'Administration

A. M. E. DEYROLLE FILS, NATURALISTE

23, rue de la Monnaie, PARIS.

Les Souscripteurs qui demeurent à l'étranger peuvent nous faire parvenir le montant de leur souscription en timbres-poste neufs de leur pays et de valeur moyenne; de un ou deux pences d'Angleterre; de deux ou quatre kreutzer d'Autriche; de vingt ou trente centimes pour la Belgique, la Suisse et l'Italie, etc., etc., etc.

PSELAPHIDES NOUVEAUX.

Depuis la publication de la première partie de mon *Species*, de nouvelles espèces rentrant dans les genres qu'elle contient ont été découvertes. Je les indiquerai brièvement :

I. — Un *Claviger* d'Espagne (je ne connais pas de provenance exacte), communiqué par M. Abeille de Perrin. Je n'ai vu qu'un seul mâle. Il est très-voisin du *Testaceus*, mais un peu plus petit que le *Pouzadui*, de même couleur; ses antennes et ses caractères sexuels sont comme chez le premier, mais les élytres sont plus courtes à proportion, avec une pubescence et une ponctuation plus grosses. Je m'abstiens de le nommer, ignorant encore si je suis autorisé à le décrire.

II. — *Chennium Prometheus*. Très-voisin du *bituberculatum*, dont il diffère par la tête à gibbosité plus élevée et les trois fossettes thoraciques réunies à la base par une large impression transversale. Le seul individu (un mâle) que j'ai vu a les articles 3 à 7 des antennes parfaitement égaux entre eux, tandis que chez *bituberculatum*, ils vont en diminuant faiblement. Tiflis.

III. — *Ctenistes Oberthürri* Perez Arcas. J'ai vu un mâle; c'est une excellente espèce sur laquelle je compte, ainsi que sur les autres dont il est ici question, m'étendre dans mes *Addenda*.

IV. — *Enoptostomus Leprieuri*; 1 millim. Un peu plus petit que ses congénères; élytres du mâle de moitié plus longues que le corselet; antennes du même à 8^{me} article carré, ainsi que le 9^{me} et le 10^{me}, lequel est de moitié plus volumineux que le précédent. Trouvé en Kabylie par M. le Dr Léprieur. Un autre exemplaire de Blidah m'a été communiqué par M. Mayet.

V. — *Amaurops exaratus* Baudi de Selve. Excellente espèce que l'auteur m'a donnée.

VI. — *Amaurops carinatus* Baudi de Selve. Excellente espèce que l'auteur m'a donnée.

VII. — *Amaurops Abeillei*. Très-voisin du *Gallicus*, dont il diffère par les élytres plus fortement arrondies sur les côtés et

les jambes plus épaisses, surtout les fémurs, principalement chez les mâles, dont les antennes ne sont pas, comme chez le *Gallicus*, sensiblement plus longues que chez les femelles. Marseille; trouvé par M. Abeille de Perrin.

VIII. — *Amaurops Revelierei*. Assez voisin du *Corsicus*, dont il diffère par le sillon médian thoracique beaucoup moins large et moins profond, ainsi que les impressions de la tête, et par les carinules abdominales du premier segment plus écartées, enfermant le tiers de la largeur du disque abdominal, tandis que chez le *Corsicus*, elles n'en enferment que le quart. Antennes semblables, même taille. Sud de la Corse (Ospedales, Quenza), M. E. Revelière. Le *Corsicus* est surtout du nord-est de l'île.

IX. — *Amaurops Kozirowiczi*. Un peu plus grand que le *Corsicus*, dont il diffère par les carinules spiniformes du corselet beaucoup plus saillantes et par les antennes plus courtes; les articles intermédiaires sont à peine plus longs que larges, tandis que chez le *Corsicus*, ils sont bien plus allongés. Même sillon thoracique, mêmes impressions à la tête et mêmes carinules abdominales que chez le *Corsicus*. J'ai vu deux exemplaires ♂ et ♀ provenant de Calvi.

X. — *Trichonyx lapidicola* Raffray. Environs d'Alger. Je ne connais pas cette espèce de vue; je serais très-obligé à l'auteur de me la communiquer à partir du mois de décembre prochain.

F. de Sauley.

NOUVELLES ESPÈCES DE CAPSINES.

1. *Psallus (Apocremnus) siculus* Reuter. :

Niger, sat dense et longius albo-pubescentis, pilis faciliter divellendis, fragilibus; antennis, articulo primo excepto, pedibusque testaceis, femoribus, præsertim posticis, basin versus infuscatis, apicem versus nigro-guttatis, tibiis spinulis sat longis nigris e punctis magnis nigris nascentibus; hemelytris fuscis, cuneo obscuriore, covio basi pallidior, cuneo arcu basali summoque apice albidis; membrana leviter infuscata, venis areolæ