

# PETITES NOUVELLES ENTOMOLOGIQUES

Paraissant le 1<sup>er</sup> et le 15 de chaque mois

## ABONNEMENT ANNUEL :

France et Algérie.....	4 fr. »
Belgique, Suisse, Italie.....	5 »
Tous les autres pays.....	6 »

(AFFRANCHISSEMENT COMPRIS).

## ADRESSER LE MONTANT DES ABONNEMENTS

Et tout ce qui est relatif à la Rédaction et à l'Administration

A. M. E. DEYROLLE FILS, NATURALISTE

23, rue de la Monnaie, PARIS.

Les Souscripteurs qui demeurent à l'étranger peuvent nous faire parvenir le montant de leur souscription en timbres-poste neufs de leur pays et de valeur moyenne; de un ou deux pences d'Angleterre; de deux ou quatre kreutzer d'Autriche; de vingt ou trente centimes pour la Belgique, la Suisse et l'Italie, etc., etc., etc.

## PSELAPHIDES NOUVEAUX.

Depuis la publication de la première partie de mon *Species*, de nouvelles espèces rentrant dans les genres qu'elle contient ont été découvertes. Je les indiquerai brièvement :

I. — Un *Claviger* d'Espagne (je ne connais pas de provenance exacte), communiqué par M. Abeille de Perrin. Je n'ai vu qu'un seul mâle. Il est très-voisin du *Testaceus*, mais un peu plus petit que le *Pouzadui*, de même couleur; ses antennes et ses caractères sexuels sont comme chez le premier, mais les élytres sont plus courtes à proportion, avec une pubescence et une ponctuation plus grosses. Je m'abstiens de le nommer, ignorant encore si je suis autorisé à le décrire.

II. — *Chennium Prometheus*. Très-voisin du *bituberculatum*, dont il diffère par la tête à gibbosité plus élevée et les trois fossettes thoraciques réunies à la base par une large impression transversale. Le seul individu (un mâle) que j'ai vu a les articles 3 à 7 des antennes parfaitement égaux entre eux, tandis que chez *bituberculatum*, ils vont en diminuant faiblement. Tiflis.

III. — *Ctenistes Oberthürri* Perez Arcas. J'ai vu un mâle; c'est une excellente espèce sur laquelle je compte, ainsi que sur les autres dont il est ici question, m'étendre dans mes *Addenda*.

IV. — *Enoptostomus Leprieuri*; 1 millim. Un peu plus petit que ses congénères; élytres du mâle de moitié plus longues que le corselet; antennes du même à 8<sup>me</sup> article carré, ainsi que le 9<sup>me</sup> et le 10<sup>me</sup>, lequel est de moitié plus volumineux que le précédent. Trouvé en Kabylie par M. le Dr Léprieur. Un autre exemplaire de Blidah m'a été communiqué par M. Mayet.

V. — *Amaurops exaratus* Baudi de Selve. Excellente espèce que l'auteur m'a donnée.

VI. — *Amaurops carinatus* Baudi de Selve. Excellente espèce que l'auteur m'a donnée.

VII. — *Amaurops Abeillei*. Très-voisin du *Gallicus*, dont il diffère par les élytres plus fortement arrondies sur les côtés et

les jambes plus épaisses, surtout les fémurs, principalement chez les mâles, dont les antennes ne sont pas, comme chez le *Gallicus*, sensiblement plus longues que chez les femelles. Marseille; trouvé par M. Abeille de Perrin.

VIII. — *Amaurops Revelierei*. Assez voisin du *Corsicus*, dont il diffère par le sillon médian thoracique beaucoup moins large et moins profond, ainsi que les impressions de la tête, et par les carinules abdominales du premier segment plus écartées, enfermant le tiers de la largeur du disque abdominal, tandis que chez le *Corsicus*, elles n'en enferment que le quart. Antennes semblables, même taille. Sud de la Corse (Ospedales, Quenza), M. E. Revelière. Le *Corsicus* est surtout du nord-est de l'île.

IX. — *Amaurops Kozirowiczi*. Un peu plus grand que le *Corsicus*, dont il diffère par les carinules spiniformes du corselet beaucoup plus saillantes et par les antennes plus courtes; les articles intermédiaires sont à peine plus longs que larges, tandis que chez le *Corsicus*, ils sont bien plus allongés. Même sillon thoracique, mêmes impressions à la tête et mêmes carinules abdominales que chez le *Corsicus*. J'ai vu deux exemplaires ♂ et ♀ provenant de Calvi.

X. — *Trichonyx lapidicola* Raffray. Environs d'Alger. Je ne connais pas cette espèce de vue; je serais très-obligé à l'auteur de me la communiquer à partir du mois de décembre prochain.

F. de Sauley.

## NOUVELLES ESPÈCES DE CAPSINES.

### 1. *Psallus (Apocremnus) siculus* Reuter. :

Niger, sat dense et longius albo-pubescentis, pilis faciliter divellendis, fragilibus; antennis, articulo primo excepto, pedibusque testaceis, femoribus, præsertim posticis, basin versus infuscatis, apicem versus nigro-guttatis, tibiis spinulis sat longis nigris e punctis magnis nigris nascentibus; hemelytris fuscis, cuneo obscuriore, covio basi pallidior, cuneo arcu basali summoque apice albidis; membrana leviter infuscata, venis areolæ

minoris albidis. Long. 2  $\frac{4}{5}$  mm. *Ps. obscurello* Fall. sat similis. Sicilia, a Dr Puton communicatus.

2. **Psallus convexus** Reut. :

Convexus, pallide flavo-testaceus, pallido-pubescentis, pilis nigris intermixtis, antennis totis flavo-testaceis; femoribus guttis majoribus fuscis minus dense collocatis, ante apicem innotatum guttis magnis transversim in linea positis, tibiis spinis nigris et punctis nigris nascentibus, tarsorum apice fusco; corio apicem versus rufo-testaceo, embolio cuneoque pallidis, hoc tantum dimidio apicali paulo obscurius testaceo; membrana ut in *Ps. diminuto* Kirschb., cui sat similis. Long. 3  $\frac{1}{2}$  3  $\frac{2}{3}$  mm.

Corsica, a Dr Puton commun.

3. **Macrocoleus Reiberi** Put. ; ♂ :

Oblongus, opacus, dilute pallide virescenti-flavescentis, supra sat longe albo-pubescentis, pilis pro certo lumine fusciscentibus; hemelytris fere unicoloribus vel corio postice macula obsoletissima obscuriore, cuneo basi albedo; membrana hyalina, venis pallidis, arcolis pallide flavescentibus, minore fusciscente, stria transversali ab apice areolæ minoris ad apicem cunei ducta aliaque longitudinali ab apice episdem areolæ versus apicem membranae excurrente pallide fusciscentibus; antennis testaceis; tibiis spinulis nigris; tarsis articulo ultimo fusciscente. Long. 3  $\frac{4}{5}$  mm. *M. Molliculo* Fall. (præsertim var. *ochroleuco* Kirschb.) similis, sed tertia parte minor, maris oculis majoribus fronteque oculo tantum dimidio latiore distinctus.

Vosges, Dr Puton.

O.-M. Reuter.

**Rectification.** — Dans les catalogues d'Hémiptères publiés par MM. Puton (cat. Hémipt. Hétér. d'Eur., 1869, p. 13), Lethierry (cat. Hémipt. Hétér. du département du Nord, 1874, p. 15) et Saunders (Syn. of Brit., Hém., 1875, p. 149), ainsi que dans les Mitth. Schweizer entom. Gesellsch, t. III, VIII, p. 417; on peut lire dans le genre *Ischnocoris* : *J. hemipterus* Sahlb. Cela tient à un lapsus calami que tous ces auteurs ont copié. Cette espèce n'est pas décrite par Sahlberg, mais par Schilling, dans les Beiträgen zur Ent., Heft I, p. 75. Il est important de rectifier cette erreur avant qu'elle se propage plus encore.

O.-M. Reuter.

### DEMANDES & OFFRES.

On désire acquérir des œufs de *Saturnia Pernyi* et *Yama-Mai*. S'adresser au bureau du journal pour avoir l'adresse du demandeur.

M. Raffray avait déjà réuni une importante collection de Coléoptères européens, lorsqu'un long séjour en Algérie, pendant lequel il recueillit une grande quantité d'insectes, éveilla chez lui le désir d'étudier plus attentivement la faune africaine et le détermina à entreprendre l'exploration de quelques régions peu connues au point de vue zoologique et même géographique de cette vaste contrée. Ces premiers voyages, en élargissant le

cercle de ses études, l'obligèrent à en restreindre le cadre, en limitant ses études entomologiques à la faune africaine. Des projets de voyage ultérieurs sur d'autres points de la même partie du monde, en l'affermissant dans cette idée, l'ont déterminé à céder sa collection d'européens qu'il serait nécessairement forcé de négliger. C'est cette collection qui est actuellement à vendre par parties séparées et dont le détail suit :

Elle se compose de toutes les espèces, y compris les uniques qui ont été récoltées par lui ou pour lui en Espagne, en Corse, à Malte, dans le département du Var, de toutes celles des différents points de l'Europe et de l'Asie occidentale qu'il a acquises par échange ou par achat, et enfin d'une collection algérienne qui comprend non seulement les espèces recueillies par lui pendant le long séjour durant lequel son temps a été exclusivement occupé par des recherches entomologiques, mais encore celles de la collection de feu Olivier (de Bône).

Elle est très-riche en espèces peu répandues dans les collections et contient un certain nombre de raretés de premier ordre. La détermination est faite avec la plus grande exactitude et est à peu de choses près complète, abstraction faite des espèces nouvelles.

Elle est entièrement en ordre et rangée uniformément dans des cartons de 19×26, neufs pour la plupart. D'ailleurs les brèves notices ci-dessous renseigneront d'une façon aussi exacte que possible les personnes qui seraient désireuses de faire l'acquisition de quelque partie.

Collection de **Cicindélides** et **Carabides**, comprenant 1,027 espèces et 3,124 individus, parfaitement déterminés, étiquetés et rangés dans 24 cartons neufs de 19 × 26. Elle renferme beaucoup d'espèces rares et intéressantes, parmi lesquelles on peut citer *Tetracha Euphratica*, *Laphyra Rilchii*, *Leistus puncticeps*, *angustatus*, *Procerus*, *Procrustes* et *Carabus*. 117 espèces parmi lesquelles *Carabus robustus*, *Kolenatii*, *Lafertei*, *Dromius lateplagiatus*, *myrmido*, *vittula*, *Apristus Prophetei*, belle suite de *Dilomus* déterminés par M. de la Brulerie, *Dilomus villosulus*, *Scarites striatus*, *Reicheia subterranea*, *lucifuga*, *Raymondi*, *Ohlænius Pavieri*, *algiricus*, *Raffr.*, type, *Bæticus*, *Ophonus Kabylianus*, *mauritanicus*, *Miscodera arctica*, belle série de *Platyderus* et *Orihomus*, *Pæcilus algiricus*, *vicinus*, *Pterostichus Schönherri*, *Veclonicus*, *Souzæ*, *Myas chalybeus*, *rugosicollis*, *Zabrus crepidoderus*, *seriatoporus*, *Acorius Ghilianii*, *Sphodrus Ghilianii*, *pinicola*, *atrocyaneus*, *Pristodactyla Caucasica*, *Palrobis punctatissimus*, *Pogonus dilutus*, *Trechus curticolis*, *Anophthalmus*, 17 esp., *Microtyphlus*, 3 esp., *Anillus*, 4 esp., etc., etc. Prix, 450 fr.

Collection d'**Hydrocanthares**, comprenant 177 espèces et 659 exemplaires, rangés dans 8 cartons de 19 × 26, parmi lesquels *Dytiscus latissimus*, *laponicus*, *Pisanus*, *Cybister africanus*, belle série d'*Hydroporus*, etc. Prix : 50 fr.

Collection de **Silphides**, **Scaphidiides** et **Trichopterygides**, comprenant 152 espèces représentées par 383 exemplaires, très-bien déterminés et rangés dans 3 cartons de 19 × 26. Elle renferme nombre de bonnes espèces, parmi lesquelles *Leptinus testaceus* *Adelops*, 23 esp., *Catopsimorphus*, 4 esp., *Hydnobius punctatus*, *Liodes Raffrayi*, *Sphærites glabratus*, *Leptoderus Hohenwarthi*, etc. Prix : 80 fr.

Collection d'**Histerides**, comprenant 92 espèces, 297 exemplaires, très-soigneusement rangés dans 2 cartons neufs de 19 × 26. Parmi les espèces principales, on peut citer *Margarinotus scalar*, *Hister Lethierryi*, *Helærius*, 3 esp., *Saprinus osyris*, *Gangelicus* d'Algérie, *Algiricus*, *figuratus*, *eaternus*, etc. Prix : 45 fr.

Collection de **Nitidulides**, **Trogosilides**, **Colydiides**, **Cucujides**, **Cryptophagides**, **Lathridiides**, etc., comprenant 300 es-