

PETITES NOUVELLES ENTOMOLOGIQUES

Paraissant le 1^{er} et le 15 de chaque mois

ABONNEMENT ANNUEL :

France et Algérie.....	4 fr. »
Belgique, Suisse, Italie.....	5 »
Tous les autres pays.....	6 »

(AFFRANCHISSEMENT COMPRIS).

ADRESSER LE MONTANT DES ABONNEMENTS

Et tout ce qui est relatif à la Rédaction et à l'Administration
A. M. E. DEYROLLE FILS, NATURALISTE
23, rue de la Monnaie, PARIS.

Les Souscripteurs qui demeurent à l'étranger peuvent nous faire parvenir le montant de leur souscription en timbres-poste neufs de leur pays et de valeur moyenne; de un ou deux pences d'Angleterre; de deux ou quatre kreutzer d'Autriche; de vingt ou trente centimes pour la Belgique, la Suisse et l'Italie, etc., etc., etc.

Diagnoses præcursoriæ.

Sous ce titre, je vous adresse quelques diagnoses succinctes d'Hémiptères nouveaux, dont les descriptions complètes seront publiées dans un ouvrage qui paraîtra sous le titre de *Fauna Hemipterorum Gymnoceratorum Europæ*, et je vous serai très-obligé, Monsieur le Directeur, de vouloir bien les insérer dans votre estimable journal.

1. **Globiceps sordidus**, n. sp. Niger, opacus, supra glaber, ♀ capite haud tumido, vertice postice obsolete marginato, antennis fusco-testaceis, articulo secundo dimidio apicali incrassato et nigro, pronoto lateribus profunde sinuatis, disco callis sat acte elevatis, obtusis, hemelytris fuscescenti-testaceis, conis basi sat late cuneoque toto pallidioribus, pedibus ferrugineis, ad partem fuscescentibus. Long., 3 1/3 millim.

Habitat Hungariam ad Pesth, Dr v. Horvath.

2. **Macrocoleus dissimilis**, n. sp. *M. molliculo* similis, sed minor, hemelytris clavo juxta commissuram corioque fascia transversa ante apicem fuscescentibus, cuneo medio fusco membrana dilute infuscata, venis pallidis, vena majore extus anguste fusco-terminata, areolis fuscescentibus, minoris dimidio externo, macula pone cuneum vittaque ab apicem areolarum apicem membranæ versus albidis. Long., 3 1/2 millim.

Hab. ad Budam Hungariæ, Dr v. Horvath.

3. **Amblytylus Horvathi**, n. sp. Sordide pallido-virescens, albedo-pubescentis, hemelytris pilis nigris parce intermistis, membrana fere omnino ut in *Macrocoleo solitario*, Meg. signata (1); femoribus atomis fuscis dense conspersis, tibiis nigro-spinulosis, pallido-pubescentibus, tarsis apice fuscis, rostro segmentum tertium ventralem attingente. Long., 3 3/4 millim.

Hab. ad Budam Hungariæ, Dr v. Horvath.

4. **Harpocera Hellenica**, n. sp. *H. thoracica* sat similis, sed minor; ♂ articulo antennarum secundo tertio levius curvato tantum paullo brevior, magis quam triente apicali clavato-incrassato, tibiis anticis et posticis leviter curvatis, articulo primo antennarum valde robusto, capite bucculisque pronoti nigro-piceis; pronoto scutelloque fusco-ferrugineis, capite margine postico lineaque per pronotum et scutellum ducta testaceis; hemelytris ferrugineis, extus basique cunei pallidis, membrana parum obscurata venis ferrugineis; subtus nigro-piceis, femoribus posticis apice piceis, pedibus cætero testaceis, tibiis et punctis parvis nigris nigro-spinulosis, tarsis apice fusco. Long., 4 1/3 millim.

♀ Fere ut in *H. thoracica* colorata, membrana pedibusque ut maris, tibiis autem rectis, antennarum articulo secundo apicem versus leviter clavato. Long., 4 2/3 millim.

Hab. in Græcia ad Naxos et Parnassos, D. Saunders; a Dr^e Puton mihi communicata.

5. **Atractotomus albipennis**, n. sp. Nigricans, aureo-pubescentis et nigro-pilosus, hemelytris sordide albedo-testaceis clavo fere toto vel tantum vena percurrente nigro-griseo, membrana infuscata venis fuscescentibus, areola minore venaque connectente necnon linea pone cuneum albidis, limbo externo membranæ late obscure fusco; antennis articulo secundo late compresso, sub-fusiforimi, articulis ultimis albidis; pedibus sordide testaceis, femoribus infuscatis, apice flavis, tibiis nigro-spinulosis, impunctatis, apice horum tarsisque fuscescentibus. Long., 3 2/5 millim. (♀)

Hab. in Sarepta Russiæ meridionalis, D. Jakovleff.

6. **Atractotomus validicornis**, n. sp. Niger, pilis micantibus albedo-flavis vestitus, cuneo concolore; antennis (♀) articulo secundo valido, fortiter incrassato, sub-fusiforime, sed crassitie maxima ante medium sita, dein apicem versus fortius acuminato, nigro-piloso; membrana venis albis, areola minore apiceque majoris nigricantibus, pone apicem cunei macula maculaque magna transversali infra venam brachialem marginem

(1) Vide Fieb.; *Eur. Hem.*, p. 321, n° 8.