

interiore infra medium sinuati. Rostrum coxas intermedias vel posticas attingens, gracile. Antennae ad sinum oculorum interne insertae, articulo primo clypei apicem haud vel paullo superante, secundo maris saepe crassiusculo. Pronotum breviter trapeziforme, saepe apice longitudine latius, margine apicali recto. Hemelytra explicata, membrana bi-areolata. Pedes femoribus punctis nigris destitutis, tarsis posticis articulo ultimo secundo longiore et duobus primis simul sumtis longitudine aequali vel sub-aequali, unguiculis longiusculis. Segmentum maris genitale subtus muticum, apertura parvula, forcipe sinistro sub-conico vel oblongo, recto, prominente, dextro obliquo; terebra feminae breviuscula.

1. *Tuponia pallida* REUT.

Tab. I, fig. 1 a—e.

Diagnosis: Dilutissime ochraceo-alba, sat dense pallido-pubescens, tantum scutello basi aurantiaco; membrana cum areolis hyalina, venis albidis, vena brachiali subtus parte dimidia apicali stria dilute sulphurea marginata; mesosterno sub-carneo; ventre basi, medio et apice virescente, lateribus segmentoque maris genitali supra aurantiaco-flavis; dorso abdominis pallido; pedibus albidis, spinulis tiliarum subtilibus albis, tantum unguiculis nigris. Long. $3\frac{1}{4}$ — $3\frac{1}{2}$ mm.

Var. β: Capite postice aurantiaco-flavo; pronoto rufescenti-albido; scutello basi aurantiaco-rubro. ♂.

Hab. in Turcomannia, D. FEDTSCHENKO!

Descr.: Corpus dilutissime ochraceo-album, sat dense pallido pubescens. Caput transversum, apice pronoti paullo latius, pronoti latitudine basali circiter $\frac{3}{7}$ (♂) vel fere duplo (♀) angustius, vertice oculo circiter $\frac{1}{3}$ (♂) vel circiter dimidio (♀) latiore; dilutissime ochraceo-album vel postice aurantiaco-flavum. Oculi fere plumbei, granulati. Rostrum albido-flavum, apice nigro, coxas intermedias attingens. Antennae corpore cum hemelytris circiter $\frac{1}{3}$ breviores, articulo secundo latitudine basali pronoti longitudine sub-aequali vel hac parum brevior (♀), maris lineari, tota longitudine leviter incrassato, feminae tantum apicem versus paullulum crassiore, duobus ultimis conjunctim secundo paullulum longioribus, quarto tertio duplo (♀) vel magis quam duplo (♂) brevior. Pronotum trapeziforme, basi quam apice circiter duplo latius, apice longitudini latitudine aequale, lateribus obsolete sinuatis, dilutissime ochraceo-album vel colore in rufescenti-album vergente, callis interdum ochraceis. Scutellum albidum, basi aurantiaco-rubrum. Hemelytra dilutissime ochraceo-alba, unicolora, membrana hyalina, venis albidis, vena brachiali subtus parte dimidia apicali stria dilute sulphurea marginata, areola majore lineola tenui ejusdem coloris prope medium venae brachialis. Mesosternum carneum. Abdomen supra albido-flavescens, subtus basi, medio et apice nonnihil virescens, lateribus latius marisque segmento genitali lateribus et supra aurantiaco-flavis. Pedes albi, femoribus dilutissime flavescens, tibiis pallido-spinulosis, summo apice dilute fuscescente; tarsis posticis longis, articulo ultimo duobus primis longitudine aequali; unguiculis nigris.