

tutis, apice tibiarum tarsisque testaceis, his posticis tibia circiter  $\frac{2}{3}$  brevioribus, articulo tertio duobus primis longitudine aequali, unguiculis nigris.

### 5. *Tuponia roseipennis* REUT.

*Diagnosis:* Ochracea, capite subtus ventreque basin versus virescentibus, supra parce nigro-pubescentis pilisque aliis subtilissimis pallidis parce intermixtis, subtus subtilissime pallido-pubescentis; hemelytris roseis, margine corii apicali cuneoque basi et marginibus latius albidis; membrana sub-hyalina, extus leviter brunnescente, venis cubitali et connectente albis, brachiali rosea, hac maculaque parva hyalina ad apicem cunei posita subtus fuscous-marginatis; tibiis nigro-spinulosis; dorso abdominis nigro. Long. ♀ 3 mm.

*Hab.* in Turcomannia (Alai!), D. FEDTSCHENKO.

*Descr.:* Species pulchra, *Psallo varianti* MEY. speciebusque confinibus generis *Psalli* simillima, differt autem structura capitinis, rostri articulo primo breviore, terebra feminae breviore, femoribus tibiisque punctis nigris omnino destitutis. Corpus ovatum, supra ochraceum, colore nonnihil in roseum vergente, breviter et parcus nigro-pubescentis, pilis pallidis subtilissimis parce intermixtis, subtus ochraceum, virescenti-variegatum, subtilissime pallido-pubescentis. Caput transversum, ochraceum, vertice oculo fere duplo latiore (♀), genis et gula virescentibus. Oculi fusci, parum granulati (♀). Rostrum coxas posticas paullulum superans, testaceum, apicem versus late piceum, articulo primo virescente, circiter trientem basalem xyphi attingente. Antennae feminae (mas ignotus) testaceae, articulo secundo latitudini pronoti basali longitudine aequali, apicem versus nonnihil obscuriore. Pronotum trapeziforme, basi longitudine fere duplo latius, apice longitudini latitudine aequale, lateribus rectis, ochraceum, posterius leviter rufescens. Scutellum ochraceum, basi saturatus rufescens. Hemelytra rosea, corio margine apicali cuneoque limbis omnibus late albidis; membrana sub-hyalina, parte exteriore brunnescente, venis cubitali et connectente albis, brachiali rosea, hac maculaque hyalina ad apicem cunei posita subtus vel postice fuscous-marginatis, areola minore disco late nigricante. Pectus rufescens-ochraceum. Abdomen dorso nigrum, lateribus et subtus ochraceum, terebra et ventre basin versus late virescentibus. Pedes femoribus dilutius ochraceo-flavis, innotatis, tibiis albidis, spinulis nigris robustis armatis, sed punctis omnino destitutis, ipso apice tarsisque obscure testaceis, unguiculis fuscis.

### 6. *Tuponia Hippophaes* (MEY.) FIEB.

Tab. II, fig. 1.

*Diagnosis:* Obscurius saturate virescens, supra nigro-pilosula et subtiliter pallido-pubescentis; antennis longis, virescenti-testaceis; rostro coxarum intermedianarum apicem attingente; hemelytris maris longissimis; corio saepe margine externo pallidiore, cuneo basi anguste albido; membrana nigricante, vena con-