

nectente (♂) vel venis omnibus albis, brachiali plerumque basin versus fuscescente (♀), areolis infuscatis; macula triangulari ad apicem cunei albida; tibiis nigro-spinulosis, sed punctis nigris destitutis; tarsis longissimis, gracillimis, apice unguiculisque nigro-fuscis. Long. ♂ 3, ♀ $2\frac{2}{3}$ mm.

Syn. Oncotylus Hippophaes (MEY.) FIEB., Eur. Hem. 299, 4!

Hab. in *Tamarice*: Gallia! et Helvetia!; Italia borealis (Liguria) in *Tamarice africana*, D. Dr FERRARI; etiam in *Hippophaë rhamnoides*, sec. D. MEYER-DUER.

Descr.: Corpus saturate virescens, supra nigro-pilosulum et subtiliter pallido-pubescentis, subtus subtilissime pallido-pubescentis. Caput oculis tota latitudine (♂) vel fere tota latitudine (♀) ultra apicem pronoti prominentibus, transversum, latitudine pronoti postica tantum circiter $\frac{1}{3}$ angustius, vertice oculo dimidio (♂) vel magis quam duplo et dimidio (♀) latiore; virescens, subtiliter pallido-pubescentis, feminae interdum pallescens. Oculi nigro-fusci, granulati, maris magni et fortiter prominentes, feminae mediocres. Rostrum testaceum, apicem coxarum intermediarum attingens, apice nigro-piceum, articulo primo caput haud superante, saepe virescente. Antennae corporis fere longitudine, obscurius testaceae vel virescenti-testaceae, pallido-pubescentes, articulo secundo lineari, latitudine postica pronoti circiter $\frac{1}{3}$ longiore (♂) vel hac vix longiore (♀), duobus ultimis conjunctim secundo longitudine aequalibus (♂) vel hoc paullo longioribus (♀), quarto tertio magis quam duplo brevior. Pronotum trapeziforme, maris quam feminae apicem versus fortius angustatum, apice quam basi fere duplo (♂) vel tantum circiter $\frac{2}{5}$ (♀) angustius, basi longitudine vix magis quam $\frac{2}{3}$ (♂) vel magis quam duplo (♀) latius, lateribus obsolete sinuatis (♂) vel sub-rotundatis (♀); virescens, antice interdum pallescens, pallido-pubescentis vel fere glabrum. Scutellum virescens, basin versus saepe flavescens. Hemelytra maris longa, lateribus parallela, maxima parte membranae abdominis dorsum superantia, feminae abdomine tantum dimidia membrana longiora, saturate virescentia, nigro-pilosula, pilis praesertim in margine externo corii distinctissimis, subtilius parciusque pallido-pubescentia, margine corii externo saepe pallidiore; cuneo basi anguste albido; membrana nigricante, venis omnibus albis vel venis brachiali et interdum etiam cubitali leviter fuscescentibus (praesertim ♂), areolis infuscatis, macula triangulari ad apicem cunei albida. Mesosternum medio pallescens. Abdomen magis minusve obscure virescens, dorso concolore. Pedes virescentes vel virescenti-flavescentes, tibiis nigro-spinulosis, punctis omnino destitutis, summo apice earum tarsisque subtestaceis, his posticis tibia tantum circiter $\frac{3}{5}$ brevior, articulo tertio duobus primis longitudine aequali vel sub-aequali, fere dimidio apicali fuscescente, unguiculis fusco-nigris.

7. *Tuponia affinis* REUT.

Diagnosis: Dilute virescens, parum nitida, pilis nigris destituta, longius et praesertim antice sat dense albo-pubescentis, pilis albis pro certo lumine fuscescentibus; antennis dimidio corpore cum hemelytris paullo longioribus, articulo secundo latitudine basali pronoti circiter $\frac{1}{4}$ brevior, duobus ultimis obscuris; rostro coxas intermedias attingente; cuneo arcu basali albida; mem-