

Syn.: *Agalliastes alutacea* var. β FIEB., l. c.

Hab. in Hispania (circa Madrid!), DD. PUTON et WUESTNEI.

Descr.: A praecedente colore obscurius ochraceo et antennarum articulo secundo longiore divergens, a sequente colore clypeoque minus prominente et a fronte obsolete discreto distinguendus. Corpus flavo-ochraceum, subtiliter pallido-pubescentius, nitidum. Caput verticale, basi pronoti circiter $\frac{3}{8}$ angustius et ejus apice paullo latius, piceo-nigrum, nitidum, vertice oculo paullo magis quam duplo latiore (\varnothing), macula vel vitta transversali marginis posticis flavo-ochracea, hac interdum magis minusve obsoleta. Rostrum testaceum, apice nigro. Antennae totae nigrae, articulo secundo latitudine capituli postica distincte longiore et latitudine pronoti basali fere $\frac{1}{3}$ breviorae. Pronotum basi longitudine paullo magis quam duplo latius, apice longitudine paullo latius, flavo-ochraceum, callis discretis, distantibus, saepe fusco-marginatis vel totis cum angulis anticis nigro-piceis; interdum totum nigrum, tantum angulis posticis late flavescens. Scutellum ochraceum, interdum basi et apice nonnihil nigricans, raro totum nigrum. Hemelytra ochraceo-flava, unicolora, membrana magis minusve fumata, venis ochraceis vel stramineis, areolis pallide flavescens, macula ad apicem cunei hyalina. Pectus piceo-nigrum, orificiis metasterni concoloribus. Abdomen dorso nigrum, connexivo ochraceo; ventre flavo-ochraceo, saepe basi et medio triangulariter nigricante, interdum nigricante, lateribus late flavescens. Coxae piceo-nigrae. Pedes ochracei, femoribus posticis interdum basin versus fuscescentibus, tibiis spinulis nigris e punctis minutissimis fuscis nascentibus.

4. *Maurodactylus bicolor* FIEB.

Tab. II, fig. 6.

Diagnosis: Sat subtiliter pallido-pubescentius, capite, vitta transversali verticis excepta, pectore, dorso abdominis, scutello saepeque etiam pronoto toto vel saltem callis fusco-nigris; connexivo flavo; hemelytris pedibusque sordide griseo-flavis, illis commissura, his femoribus posticis tarsisque omnibus fuscis. Long. ♂ 3—3 $\frac{1}{2}$ mm.

Syn.: *Agalliastes bicolor* FIEB., ined.

Hab. in Rossia meridionali (Astrachan!), D. JAKOVLEFF; Turkestan!, D. FEDTSCHENKO; Hispania (Madrid!), D. Dr. PUTON.

Descr.: A praecedentibus colore pallido in griseum vergente, commissura hemelytrorum fuscescente, clypeo a fronte impressione paullo fortiore discreto et magis prominente distinguendus. Corpus sat subtiliter et densius pallido-pubescentius. Caput verticale, basi pronoti circiter $\frac{3}{7}$ angustius et ejus apice paullo latius, fusco-nigrum vel fuscum, semper linea transversali marginis verticis ochracea. Rostrum coxas intermedias attingens, flavescens, apicem versus nigrum. Antennae nigrae, articulo secundo latitudine capituli postica longiore. Pronotum basi longitudine circiter duplo et apice longitudine paullo vel parum latius, totum nigro-fuscum vel sordide et pallide griseo-flavum, apice nonnihil virescens, callis bene discretis, distantibus, fuscis. Scutellum totum