

guenda; vertice oculo  $\frac{3}{4}$  ( $\sigma$ ) latiore. Oculi nigro-fusci, granulati. Rostrum flavescens, coxas posticas attingens, articulo primo medium xyphi prosterni attingente. Antennae maris (femina mihi ignota) dimidii corporis longitudine, articulo primo elongato-obconico, apicem clypei fere dimidio longitudinis superante, articulo secundo crassiusculo, lineari, latitudini pronoti basali longitudine aequali, duobus ultimis simul sumtis secundo brevioribus, tertio secundo circiter  $\frac{2}{5}$  brevior, quarto tertio duplo vel magis quam duplo brevior. Pronotum trapeziforme, basi longitudine duplo latius, margine postico medio sub-sinuato, apicem versus sat angustatum, apice longitudini latitudine sub-aequale, disco callis discretis medio confluentibus, pone illos transversim nonnihil impressum. Hemelytra clavo convexiusculo, corio nonnihil pellucido, vena postcostali anguloque interno paullo saturatius coloratis, cuneo basi late albida, sub-hyalina, angulo interno tamen ad venam cubitalem usque ochraceo-flavo; membrana hyalina, venis ochraceo-flavis. Pectus et abdomen unicoloriter ochraceo-flava. Pedes pallide ochraceo-flavi, tibiis spinulis sat longis nigris, tarsis articulo ultimo summo apice fuscescente. Segmentum maris genitale fere dimidium apicalem abdominis occupans.

## Gen. V. PAREDROCORIS REUT.

Tab. I, fig. 5.

*Diagnosis:* Corpus oblongo-ovatum, subtilius pubescens, pilis nigris destitutum; capite fortiter nutante, transverso, breviter quinquangulati, a latere viso longitudini altitudine aequali, vertice obsolete marginato, fronte declivi, clypeo sat leviter prominente, basi a fronte parum discreta et in linea intermedia oculorum posita, gula brevi; oculis sub-laevibus, ab apice pronoti paullulum remotis, verticis margine postico pone oculos distinguendo; rostro apicem coxarum intermediarum attingente, articulo primo medium xyphi paullo superante; antennis articulo primo oblongo-obconico, apicem clypei superante; pronoto brevi, apice late sinuato, lateribus sub-rectis; pedibus totis concoloribus, femoribus posticis haud incrassatis, tibiis nigro-spinulosis, sed haud nigropunctatis, tarsis posticis articulo tertio secundo brevior; maris segmento genitale subtus mutico.

*Habitat* species unica in Rossia meridionali.

*Descr.:* A genere *Asciodema* REUT., cui primo intuitu sat similis, structura capitatis, vertice marginato, oculis sub-laevibus, ab apice pronoti paullulum remotis, antennarum articulo primo oblongo-obconico nec elongato, pronoti apice tota latitudine late sinuato, callis omnino obsolete distinguendus. Corpus oblongo-ovatum, subtilius pallido-pubescens vel supra sub-glabrum, pilis nigris omnino destitutum. Caput fortiter nutans, breviter quinquangulare, latitudine pronoti basali paullo magis quam duplo angustius, transversum, latitudine cum oculis circiter  $\frac{1}{4}$  brevius, apicem versus haud productum, a latere autem visum altitudini longitudine aequale, vertice postice leviter rotundato, obsolete marginato, margine postico etiam pone oculos distinguendo,