

fronte declivi, clypeo sat leviter prominente, a latere viso angusto, leviter arcuato, basi a fronte parum discreto et in linea intermedia oculorum posita, genis saltem maris valde humilibus, bucculis aequalibus, gula brevi. Oculi oblongi, in lateribus capituli nonnihil oblique positi, ab apice pronoti paullulum remoti, ut margo posticus verticis pone oculos dignoscitur, apicem versus vix divergentes, sed orbita interiore mox infra medium leviter sinuati, sub-laeves. Rostrum apicem coxarum intermediarum attingens, articulo primo medium xyphi paullo superante. Antennae ad summum apicem oculorum interne insertae, articulo primo oblongo-obconico, apicem clypei superante. Pronotum breviter trapeziforme, basi longitudine circiter duplo latiore, lateribus apicem versus sat fortiter angustatis, sub-rectis, apice tota latitudine late et sat leviter sinuato subtilissimeque marginato, margine basali truncato, disco apicem versus leviter declivi, callis omnino obsoletis. Scutellum basi detectum. Hemelytra explicata, membrana biareolata. Xyphus prosterni convexus. Mesosternum sub-horizontale, apice truncatum. Pedes colore corporis, femoribus innotatis, posticis, saltem maris, elongatis, tibiis nigro-spinulosis, sed punctis nigris omnino destitutis; tarsis posticis articulo tertio duobus primis conjunctim multo brevioribus et secundo circiter $\frac{1}{4}$ brevioribus.

1. *Paredrocoris pectoralis* REUT.

Diagnosis: Flavo-ochraceus, subtiliter pallido-pubescens vel supra subglaber (an pilis divulsis?), oculis nigro-fuscis; summo margine apicali pronoti, mesosterno apiceque rostri et articuli tarsorum ultimi fusciscentibus. Long. ♂ 3 mm.

Hab. in Rossia meridionali (Sarepta!), D. JAKOVLEFF.

Descr.: *Asciodemati Fieberi* DOUGL. et SC. similis, differt autem notis genericis, colore paullo obscuriore pectoreque fusciscente. Corpus oblongo-ovatum, flavo-ochraceum, supra subglabrum (an pilae pallidae in specimine descripto detritae?), subtus subtilissime pallido-pubescens. Caput vertice (♂) oculo fere duplo latiore. Oculi nigro-fusci. Rostrum flavum, apice fusciscentis. Antennae articulo secundo latitudine pronoti basali circiter $\frac{2}{5}$ brevioribus, maris sat incrassato, articulo tertio secundo paullo magis quam $\frac{1}{4}$ brevioribus. Pronotum basi longitudine paullo magis quam duplo latius, apice longitudine angustius. Hemelytra corio sub-pellucido, punctis saturatius flavis praesertim pro certo lumine distinctis consperso, vena cubitali bene discreta, membrana subhyalina vel dilutissime fumata, venis flavo-ochraceis. Mesosternum fusciscentis. Pedes corpori concolores, femoribus innotatis, tibiis nigro-spinulosis, tarsis articulo ultimo dimidio apicali fusciscentibus.

Gen. VI. TRAGISCOCORIS FIEB.

Tragiscus FIEB. olim, *Plagiognathus* subg. *Tragiscocoris* REUT.

Tab. I, fig. 6.

Diagnosis: Corpus elongatum (♂) vel oblongum (♀), pilis squamiformibus destitutum, supra nigro-pilosum et subtiliter albido-pubescens, capite verticali,