

spinulis nigris e serie punctorum in facie superiore positorum nascentibus." (sec. JAKOVLEFF).

#### 4. *Campylomma diversicornis* REUT.

*Diagnosis:* Pallide straminea, nitida, pilis longioribus flavescentibus pro certo lumine fuscis pubescens; antennis articulis duobus primis, summo apice articuli primi excepto, nigris, ultimis albis; capite, margine postico excepto, pronoto basin versus, basi scutelli mesosternoque aurantiaco-testaceis; clypeo concolore; femoribus parce nigro-punctatis. Long.  $2\frac{1}{2}$ — $2\frac{2}{3}$  mm.

*Var. β:* Antennis articulo primo pallido, tantum annulo ante apicem fusco vel nigro.

*Hab.* in Turkestan!, D. FEDTSCHENKO.

*Descr.:* Corpus pallide stramineo-flavum, nitidum, supra pilis longioribus flavescentibus pro certo lumine fuscis pubescens, subtus subtilissime pallido-pubescens. Caput aurantiaco-testaceum, clypeo toto concolore, margine verticis albido. Oculi fusci. Rostrum pallide stramineum, apice nigro-piceo. Antennae articulis duobus primis, summo apice tantum articuli primi excepto, nigris, articulis ultimis gracilibus, albis. Pronotum pallide stramineum, colore basin versus in aurantiaco-testaceum vergente. Scutellum pallide stramineum, basi dilute sub-aurantiaco-testaceum. Hemelytra stramineo-alba, sub-pellucida, membrana sub-hyalina, venis albidis. Mesosternum aurantiaco-testaceum. Abdomen pallide stramineum vel stramineo-flavum (♀), interdum leviter fuscescens (♂). Pedes albidus, femoribus anterioribus subtus tantum punctis duobus vel tribus nigris, posticis tantum punctis tribus in seriem obliquam ante apicem positus punctoque medio marginis inferioris nigris; tibiis spinulis nigris e punctis nigris nascentibus, punctis basin tiliarum versus majoribus, apicem versus parvis; tibiis anticis dimidio apicali inpunctatis.

#### Gen. X. **NEOCORIS** DOUGL. et Sc.

*Plagiognathus* p. FIEB., *Agalliastes* p. FIEB., *Microsynamma* FIEB., *Mono-synamma* SCOTT, *Plagiognathus* subg. *Neocoris* REUT.

Tab. I, fig. 10.

*Diagnosis:* Corpus ovatum, pubescens, capite verticali, majusculo, dimidia basi pronoti distincte latiore, vertice marginato vel margine postico acuto, antice ad oculum utrinque areola impressa nitidior instructo, fronte nitida, nonnihil convexiuscula, oculis exsertis, laevibus; antennis articulo secundo latitudine pronoti basali distincte brevior; pronoto trapeziformi, saepe minus transverso, margine antico recto longitudini latitudine aequali, lateribus rectis; femoribus posticis modice incrassatis, tibiis pallidis, nigro-spinulosis et -punctatis; tarsis articulo ultimo secundo parum brevior; maris segmento genitali subtus mutico.