

*maris* nigrum, *feminae* lateribus apiceque fulvo-maculatum. Coxae *maris* nigrae, apice cum trochanteribus albae, *feminae* lutescentes totae. Femora *maris* nigra, apice lutea, *feminae* lutescentia, apicem versus nigricantia. Tibiae flavo-testaceae spinulis nigris e punctis nigris nascentibus, ipsa basi femorum testacea. Tarsi testacei, articulo ultimo fusco.

### 3. *Neocoris basalis* REUT.

*Diagnosis:* Niger, longius et minus subtiliter flavo- vel pallide aureo-pubescentis, pubescentia facilliter divellenda; antennis articulo primo flavo, basi annuloque ante apicem nigris, secundo nigro vel obscurius flavo-testaceo, ultimis dilutioribus; sutura clavi, margine corii apicali cuneoque basi et apice albis; membrana minus obscurata, fusco-signata, venis albidis, vel vena brachiali fusca, pedibus, coxis exceptis, flavis, femoribus posticis ante apicem late fuscis, tibiis nigrospinulosis, punctis ad basin spinarum ipsaque basi nigris; pronoto sub-laevi. Long.  $3\frac{1}{4}$ — $3\frac{2}{3}$  mm.

*Var. α:* Sutura clavi anguste albicante, antennis articulo secundo nigro, duobus ultimis fuscis. ♂.

*Var. β:* Sutura clavi late lineaque basali corii albis; antennis articulo secundo articulisque ultimis fuscescentibus, secundo basi nigra, medio latius testaceo, vel testaceis, tantum basi articuli secundi nigra. ♂, ♀.

*Hab.* in Turkestan!, D. FEDTSCHENKO.

*Descr.:* A *N. Bohemani* FALL., cui sat similis, corpore magis nitido, multo longius et minus subtiliter flavo-pubescente, cuneo basi late et etiam apice albissimis basique tiliarum nigra mox distinguendus. Corpus nigrum, nitidum, longius et minus subtiliter flavicanti- vel fere pallide aureo-pubescentis, pubescentia autem saepe tota divulsa. Caput nigrum, margine verticis plerumque lutescente. Rostrum coxas intermedias attingens, testaceum, apice piceo. Antennae articulo primo flavo, basi annuloque ante apicem nigris, secundo nigro vel fusco, medio testaceo, basi nigra (♂), vel testaceo, basi nigra (♀), *maris* quam *feminae* crassiore. Pronotum callis sat discretis, nigrum, nitidum, sub-laeve, basi longitudine tantum circiter  $\frac{3}{4}$  latius. Scutellum nigrum, nitidum. Heme-lytra nigra, sutura clavi magis minusve late, vitta basali corii, interdum deficiente, margine corii apicali cuneoque basi late et apice angustius albis; membrana dilutius infuscata, venis albidis, brachiali saepe fuscescente fusco- et dein hyalino-cinctis, areola majore apicem versus magis minusve late areolaeque minore tota infuscatis, macula ad apicem cunei albido-hyalina, ad apicem venae cubitalis striola longitudinali fuscescente, interdum etiam macula vel arcu discoidali albida. Pectus et abdomen nigra. Coxae nigrae, summo apice pallidae. Pedes flavi, femoribus intermediis apice punctis nonnullis nigris, posticis ante apicem late fuscis, apice punctis nonnullis nigris, tibiis albido-flavis, spinulis nigris e punctis magnis nigris nascentibus ipsaque basi nigra, tarsis testaceis, articulo primo fuscescente, ultimo nigro-fusco.