

circiter  $\frac{1}{3}$  angustius, vertice immarginato, fronte declivi, clypeo ab illa parum discreto, a latere viso arcuatim prominulo, basi sat longe supra basin antennarum, fere in linea intermedia oculorum posita, gula nonnihil obliqua, distinguenda. Oculi apicem versus divergentes, orbita interiore vix sinuati. Rostrum gracile, coxas posticas attingens, articulo primo fere dimidium xyphi attingente, secundo et tertio subaequalibus, quarto primo paullo longiore. Antennae ad apicem oculorum interne insertae, articulo primo dimidio longitudinis apicem clypei superante, articulo secundo capitis latitudine basali longiore. Pronotum breviter trapeziforme, lateribus rectis, basi sub-truncata, disco (*formae brachypterae*) plano, callis sat obsoletis. Scutellum pronoto paullo brevius. Hemelytra abbreviata, segmentum dorsalem ultimum haud tegentia, apice sub-truncata, clavo, cuneo membranae discretis, cuneo brevissimo, margine externo valde rotundato-excurvato ibique corii margine laterali circiter  $4\frac{1}{2}$  brevior, membrana brevi et apicem cunei haud superante, tantum intus ad illius marginem posita, sub-coriacea. Xyphus prosterni convexus, latius triangularis. Pedes femoribus posticis incrassatis, apice nigro-punctulatis, tibiis nigro-spinulosis, tarsis posticis articulo tertio secundo longitudine aequali, primo hoc fere  $\frac{1}{3}$  brevior.

### 1. *Malacotes Mulsanti* REUT.

Tab. I, fig. 13.

*Diagnosis:* Pallido-virescens, supra longe et minus tenuiter pallido-pubescentis; antennis articulo secundo latitudine postica pronoti vix vel paullulum brevior; femoribus supra apice atomis parvis punctoque utrinque setifero marginali et subtus atomis sparsis apicalibus, puncto setifero prope apicem marginis superioris punctisque marginis inferioris in seriem positos nigris; tibiarum dimidio basali spinulis e punctis nigris nascentibus. Long. ♀  $2\frac{1}{3}$  mm.

*Hab.* in Gallia meridionali, D. REY.

*Descr.:* Corpus pallido-virescens, supra longe et minus tenuiter pallido-pubescentis, infra subtiliter pallido-pubescentis. Caput supra visum latitudini inter oculos longitudine fere aequale, vertice feminae oculo circiter  $2\frac{1}{3}$  latiore. Rostrum virescens, apicem versus testaceum, apice nigrum. Oculi nigro-fusci. Antennae articulo secundo latitudini capitis basali fere  $\frac{1}{3}$  longior et basi pronoti paullulum vel vix brevior, articulis ultimis simul sumtis secundo longitudine aequalibus; totae pallido-virescentes, articulo primo intus setis et saepe punctis duobus fuscis. Pronotum basi longitudine fere duplo latius, lateribus apicem versus leviter angustatum, disco plano, pallido-virescens, interdum maculis obsoletissimis dilutissime ferrugineis notatum. Scutellum pallido virescens, apice interdum obsoletissime ferrugineo. Hemelytra cum membrana pallide virescentia, unicolora. Pedes pallido-virescentes, femoribus supra apice atomis parvis punctoque utrinque marginali setifero et subtus atomis sparsis apicalibus, puncto setifero prope apicem marginis superioris punctisque marginis inferioris in seriem positos nigris; tibiis spinulis longioribus nigris in dimidio basali tibiarum e punctis nigris nascentibus, tarsis articulo ultimo apice nigro-fusco.