

Var. β: Major, latior et robustior, nigra, pronoto minus transverso, ab domine valde rotundato-ampliato, membranae vena cubitali sub-obsoleta; cetero omnino ut forma typica. Long. ♀ $3\frac{1}{3}$ mm.

Syn.: *Colpochilus tenuicornis* REUT., Gen. Cim. Eur. p. 60.

Hab. in Gallo: Gallia! et Germania!; Italia, D. Dr FERRARI; Rossia meridionalis, D. JAROSCHEFFSKY; Livonia, D. Prof. FLOR.

Deser.: Corpus nigricans vel fusco-nigrum, supra subtiliter nigro-pilosum, squamulis faciliter divellendis aureis intermixtis. Rostrum coxas posticas attingens, piceum. Antennae corpori longitudine fere aequales, in *mare nigrae*, interdum articulo primo apice secundoque basin versus magis minusve pallidis, hoc sub-aequaliter incrassato et ultimis simul sumtis nonnihil latitudineque pronoti basali multo longiore; in *femina* flavae, articulo primo basi anguste nigro, articulis ultimis (vel tantum ultimo) fuscescentibus. Pronotum basi longitudine circiter $\frac{2}{3}$ latius, apice longitudine fere $\frac{1}{4}$ angustius, nigrum vel fusco-nigrum. Hemelytra nigra vel fusco-nigra, tantum margine corii apicali apiceque cunei albidis, membrana nigricante, vena connectente striaque pone apicem cunei albidis. Femora nigra, apice flava. Tibiae flavae, nigro-spinulosae, sed haud nigro-punctatae, apice nigro. Tarsi testacei, articulo ultimo apice fusco.

7. Criocoris moestus REUT.

Diagnosis: Nigricans vel nigro-piceus, supra subtiliter nigro-pilosus, squamulis aureis faciliter divellendis parcus intermixtis, femorum apice, tibiis tarsisque flavis, apice nigro, tarsis apice fuscis; hemelytris omnino unicoloribus; antennis saltem feminae corpore fere $\frac{1}{3}$ brevioribus. Long. ♀ $2\frac{1}{2}$ mm.

Syn.: *Criocoris moestus* REUT., Pet. nouv. ent. II, N:o 144, 22, 9!

Hab. ad Budam! Hungariae, Dr v. HORVATH; Gallia (St. Antonin!), D. LETHIERRY.

Deser.: Corpus nigricans vel fusco-nigrum, nitidum, supra nigro-pilosum, squamulis aureis faciliter divellendis parcus intermixtis. Caput latitudine parum longius (♀). Rostrum obscure testaceum. Antennae feminae (mas ignotus) corpore circiter $\frac{1}{4}$ breviiores, flavae, articulo primo basi anguste nigro vel fusco, secundo ultimis simul sumtis distincte breviore, apicem versus paullo incrassato ibique saepe obscuriore, duobus ultimis saepe fuscescentibus. Pronotum et scutellum piceo-nigra. Hemelytra unicolora, fusco-nigra, membrana nigricante, venis fuscis, macula parva in medio basis areolae majoris saepe deficiente punctoque in apice venae cubitalis albidis, pone apicem cunei linea parva angulum areolae minoris attingente albida. Femora nigra vel fusca, apice albido-flava. Tibiae albido-flavae, nigro-spinulosae, sed haud nigro-punctatae. Tarsi flavi, articulo primo testaceo, tertio toto vel apicem versus fuscescente.

Gen. XVI. EXCENTRICUS REUT. Tab. I, fig. 16.

Atractotomus p. FIEB.

Diagnosis: Corpus oblongum, pilis vel squamulis albis vel argenteis faciliter divellendis vestitum, nigro-pilosum; capite leviter nutante, acute quinquan-