

Syn.: Capsus planicornis H. SCH., Wanz. Ins. III, 84, fig. 306.

Hab. in Gallia (Forêt de Boscodon! basses-Alpes), Dr. PUTON; Germania (Francken), sec. HERRICH-SCHAEFFER.

Descr.: Corpus nigrum, opaculum, supra squamulis pilisque albis sat dense vestitum. Caput totum nigrum. Rostrum nigro-piceum, articulo primo obscure testaceo. Antennae articulo primo valde tumido-clavato, secundo lato, elongato-ovato compresso, (supra, an semper?, longitudinaliter obsoletius sulcato), articulo primo paullo magis quam triplo tertioque circiter duplo et dimidio longiore, sat breviter nigro-piloso et albo-squamuloso, basin versus interdum ferrugineo, articulo tertio nigro, tantum basi et apice anguste testaceo. Pronotum nigrum. Hemelytra nigra, membrana cum areolis fere aequaliter nigricante, venis albidis, pone apicem cunei macula parva hyalina notata. Metasternum orificeis testaceis. Pedes toti nigro-fusci.

2. *Excentricus punctipes* FIEB.

Tab. I, fig. 16 a — c. Tab. V, fig. 2.

Diagnosis: Niger, sat nitidus, nigro-pilosus, supra squamulis argenteis facillime divellendis sat dense ornatus; vertice stria transversali ferruginea; antennae articulo secundo tumido-fusiformi et primo tantum circiter duplo longiore, duobus ultimis albidis; summo apice femorum tibiisque flavis, his subtiliter nigro-pubescentibus, spinulis nigris e punctis nigris nascentibus, linea basali inferiore apiceque nigris. Long. ♀ 4 mm.

Syn.: *Atractotomus punctipes* FIEB., Wien. ent. Monatsschr. VIII, 224, 26.

Var. pictipes mihi: Ut supra, sed tibiis omnibus maculis vel annulis magnis ipsaque basi nigris, acetabulis omnibus extus macula laterali alba. Long. ♂, ♀ $3\frac{2}{3}$ — $4\frac{1}{2}$ mm.

Hab. forma typica in Rossia meridionali, sec. D. Prof. FREY-GESSNER. Varietatem in Sibiria (Irkutsk!) legit D. Dr F. SAHLBERG.

Descr.: Forma typica (mihi ignota): Corpus nigrum, nigro-pilosum, sat nitidum, supra squamulis argenteis facillime divellendis sat dense pubescens. Caput vertice striga sub-elevata transversali ferruginea. Antennae articulis duobus primis nigris, nigro-pilosis, articulo secundo tumido-fusiformi et primo circiter duplo longiore, articulis duobus ultimis albido-flavis, simul sumtis secundo longitudine aequalibus (sec. picturam Fieberi), pallido-pubescentibus. Pronotum nigrum. Hemelytra nigra vel colore nonnulli in flavum vergente, membrana nigricante, venis fuscis, sed venis brachiali et connectente utrinque anguste hyalino-cingulatis, connectente interdum pallida, ad apicem venae cubitalis macula parva rotundata albido-hyalina. Femora nigra, apice albo. Tibiae albido-flavae, nigro-pubescentes, spinulis nigris e punctis nigris nascentibus (punctis in tibiis anticis nullis?), linea basali inferiore ipsoque apice nigris; basi supra albido-flava. Tarsi nigro-fusci (sec. descriptionem et picturam Fieberi). Specimina sibirica (var. *pictipes* mihi) a descriptione Fieberi notis nonnullis divergunt et forsitan speciem propriam constituunt. Squamulae corporis in speciminibus omnibus omnino divulsis. Caput omnino ut formae typicae. Rostrum (a Fieber haud descriptum) piceum, articulo primo ad magnam par-