

Hab. in Gallia!, Germania et Rossia meridionali; Graecia (Peleponnesos!), D. Dr KRUEPER.

Descr.: Corpus nigrum, nitidum, pilis squamiformibus albis vel dilute flavescentibus faciliter divellendis vestitum, parce nigro-pilosulum, tenuiter albo-pubescentis. Caput vertice interdum margine postico pallido. Rostrum fuscescens, articulo primo testaceo. Antennae articulis duobus primis nigris, nigro-pilosis, secundo maris elongato-fusiformi, feminae crasse fusiformi. Pronotum basi longitudine haud duplo latius, apice longitudine latitudine aequale, callis disci vix discernendis. Hemelytra nigro-picea, membrana obscure fumata, venis fusciscentibus vel fuscis, saltem vena brachiali extus fusco-cingulata, circa areolas interdum arcu pallidiore, inter apicem cunei et apicem areolae majoris arcu postice concavo, maculam antice rotundatam obscurius fuscam terminante signata, saepe tamen fere unicoloriter obscure nigro-fusco. Femora nigra, apice pallida. Tibiae subtus longitudine tota late nigrae, supra albae, spinis nigris sat longis e punctis magnis nigris, latitudinem totam tibiae occupantibus, nascentibus. Tarsi nigri.

4. *Atractotomus femoralis* FIEB.

Tab V, fig. 6.

Diagnosis: Nigricans, squamis flavis vestitus, nigro-pilosus, antennis articulis duobus primis nigris, articulo secundo crasse fusiformi, ultimis albidis; hemelytris unicoloribus, membranae venis obscure fuscis; femorum apice, tibiis tarsisque sordide albidis, illis dimidio basali apiceque fuscis, punctis nigris destitutis. Long. $4\frac{1}{3}$ mm.

Syn.: *Atractotomus femoralis* FIEB. Eur. Hem. 295, 4.

Hab. in Bohemia, sec. FIEBER.

Descr.: Corpus nigricans, squamis albis vestitum. Antennae articulis duobus primis nigris, secundo crasso, fusiformi et primo haud triplo longiore, ultimis capillaribus, albidis. Hemelytra unicolora, membrana fusca, areolis concoloribus, vena connectente rufescente, inter apicem cunei et apicem areolae majoris stria albida sub-angulata. Femora picea, apice pallida. Tibiae sordide albae, dimidio basali et apice fuscae, spinis nigris, sed punctis nigris destitutae. Tarsi sordide albi. — Obs. *Variat* junior rufescens. (Sec. Fieber).

5. *Atractotomus parvulus* REUT.

Diagnosis: Ovatus, niger, opaculus, squamis argenteis densius vestitus, nigro-pilosus; antennis articulis duobus primis nigris, secundo fusiformi, nigropiloso, basin versus sensim graciliore, ultimis albidis; hemelytris unicoloribus, membrana obscure nigricante, venis obscure fuscis, vena connectente obscure fusco-testacea; femorum apice, tibiis tarsisque sordide testaceis, tibiis posticis obscurioribus. Long. ♀ $2\frac{1}{4}$ mm.