

nis rufescenti-testaceis; vertice oculo circiter duplo (σ) vel fere $2\frac{1}{3}$ (φ) latiore. Long. σ $2\frac{3}{4}$, φ 3 mm.

Syn.: *Psallus Wollastoni* REUT., Ent. Monthl. Mag. XIII, p. 154!

Hab. in insula Madeira!, D. WOLLASTON, a Dre BUCHANAN WHITE mihi benevole communicatus.

Descr.: Species pubescentia flava subtili, pictura insigni cunei, femoribus vix fusco-punctatis tibiisque punctis ad basin spinarum minutissimis bene distincta. Corpus flavo-testaceum, nitidum, supra nigro-pilosulum et subtiliter pallide flavo-pubescentis. Caput flavo-testaceum, marginibus orbitalibus vittisque duabus frontis obsoletis rubidis; vertice oculo circiter duplo (σ) vel fere $2\frac{1}{3}$ (φ) latiore. Rostrum flavo-testaceum, apice nigro. Antennae testaceae, maris articulo secundo tota longitudine sat fortiter incrassato, apicem versus articulisque ultimis fusciscentibus, his simul sumtis secundo longitudine fere aequalibus; feminae totae flavo-testaceae, articulo secundo apicem versus paullulum crassiore (articulus ultimus in exemplo descripto deest). Oculi nigro-fusci, maris quam feminae paullulum majores. Pronotum basi longitudine paullo magis quam duplo latius, lateribus apicem versus minus fortiter angustatum, flavo-testaceum, disco antice magis minusve rubidine pictum. Scutellum rufo-testaceum, linea media magis minusve lata albida. Hemelytra rufo-testacea, clavo margine scutellari commissuraque, corio sutura clavi limboque externo nec non cuneo pallidioribus (σ) vel pallide flavo-testacea, clavo extus apicem versus corioque plaga ad angulum apicalem internum ducta rubidis (φ), cuneo utriusque sexus flavo-testaceo, basi haud pallidioris, sed margine interno ad apicem usque sat late saturate rubro; membrana innotata, maris fumata, feminae pallida, venis rufescenti-testaceis. Pectus lateribus rufescens. Pedes flavo-testacei, femoribus magis minusve rubidis, anterioribus fere innotatis, posticis rubidis, supra innotatis, infra punctis nonnullis obsolete fusciscentibus prope marginem anticum sub-seriatis signatis, tibiis spinis nigris, validioribus et longioribus, e punctis nigris tantum in basi spinarum conspicuis nascentibus, tarsis apice nigro. Abdomen rufescenti-testaceum, marginibus segmentorum flavis (σ), vel flavo-testaceum, segmento genitali ultimo utrinque rufescente (φ).

37. *Psallus nebulosus* REUT.

Tab. I, fig. 18, 1, (tarsus).

Diagnosis: Gracilis, albicanti-flavescens, longe et dense pallido- vel supra fere albo-pubescentis, pubescentia autem divellenda; capite saltem lineis frontalibus transversis aurantiaco-rubris, pronoto aurantiaco-rubro-consperso, scutello basi aurantiaco-rubro, ipso apice anguste nigricante; hemelytris maculis parvis aurantiaco-rubris adpersis, apice clavi fasciaque lata apicali corii fusciscentibus vel fusco-purpureis, membrana obscurius cinereo-nebulosa et variegata, venis albidis, macula ad apicem cunei rectangulari aliaque marginis externi ante medium posita hyalinis; femoribus posticis apicem versus fusciscenti-rubris, mi-