

Ins. II, 100, fig. 184, ♂. *Capsus* id. MEY., Rh. Schw. 85, 66? KIRSCHB., Rh. Wiesb. 70, 77 (♀), 75, 77 (♂). *Capsus* id. mas F. SAHLB., Mon. Geoc. 92, 3! *Malthacus* id. FIEB., Eur. Hem., 312, 1. *Byrsoptera* id. DOUGL. et Sc., Br. Hem. 352, 1, Tab. XI, fig. 6, ♀. — *Byrsoptera erythrocephala* SPIN., Ess. 191.

Hab. in *Urtica dioica* per fere totam Europam; in Svecia media! et in Fennia australi! usque; Asia minor (Smyrna!), Dr KRUEPER.

Descr.: Corpus nigrum, nitidum, pallido-pubescent. Rostrum luteum, articulo primo piceo. Pedes cum coxis lutei. Sexus dissimiles. *Mas*: Corpus elongatum, parallelum. Caput nigrum. Oculi fusco-ferruginei. Antennae articulo primo lutescente vel fusco, tantum basi testaceo, secundo toto nigro, pronoti latitudine postica multo longiore et duobus ultimis simul sumtis paullo breviore, his tenuibus, albidis. Pronotum campanuliforme, basi longitudine tantum paullo latius, disco apicem versus declive, callis discretis, lateribus distincte sinuatis apicem versus fortius angustatum, nigrum. Scutellum nigrum. Hemelytra fusca vel fusco-fuliginosa, cuneo albido-flavente, marginibus ejus venisque membranae aequaliter nigricantis aurantiacis, macula membranae ad apicem cunei albo-hyalina. *Femina*: Corpus breviter ovale, postice fortiter ampliatum. Caput rufum vel carneum, apice clypei nigro. Oculi fusi. Antennae luteae, articulo primo saepe ad basin fusco, secundo triente apicali saepeque etiam summa basi nigro, duobus ultimis hoc longioribus, gracillimis. Pronotum formae hactenus cognitae subrectangulare, disco antico convexum, nitidum, basi supra scutellum fortiter emarginatum, nigrum. Scutellum nigrum, planum. Hemelytra tota coriacea, convexa, apice late rotundata, basin segmenti ultimi dorsalis attingentia, nigra, nitida, margine apicali testacea.

2. *Byrsoptera rossica* REUT.

Diagnosis: Niger, nitidus, minus subtiliter pallido-pubescent, capite concolore, rostro, antennis pedibusque luteis, articulis antennarum primo basi secundoque apice nigris, femorum basi coxisque albidis, his basi ferrugineis; hemelytris totis coriaceis, segmentum dorsi abdominis ultimum attingentibus, apice anguste obscure testaceis. ♀ Long. $2\frac{1}{2}$ mm.

Hab. in Rossia meridionalis (Charchov!), communicavit D. Dr PUTON.

Descr.: *B. rufifronti* FALL. statura similis, differt autem feminae capite concolore, statura magis elongata hemelytrisque minus convexis, apice minus late rotundatis. *Mas* ignotus. *Femina*: Corpus nigrum, nitidum, supra minus subtiliter pallido-pubescent, infra sub-glabrum. Caput nutans, nigrum, nitidum, vertice oculo duplo latiore. Rostrum luteum, coxas posticas attingente, articulo primo nigro-piceo. Antennae luteae, articulo primo basi nigro, secundo circiter sexta parte apicali nigra. Pronotum basi capite vix latius, disco antico convexum, lateribus ante angulos basales sinuatis. Hemelytra oblongo-ovata, minus convexa, tota coriacea, apice minus late rotundata ibique anguste obscure testacea. Abdomen ovatum. Pedes lutei, femoribus basi coxisque albidis, his basi piceis, tarsis articulo tertio summo apice fuscescente.