

nis et pedibus subtilius pallido-pubescens, illis articulis ultimis magis minusve fusciscentibus, femoribus subtus atomis fusciscentibus vix distinguendis parce adpersis, tibiis spinulis fuscis vel testaceis, ipso apice tarsorum fusco; angulo corii apicali interno basaliq. interno cunei levissime infuscatis, areola majore intus leviter fusciscente; capite latitudine parum (♂) vel paullo (♀) longiore, vertice oculo triplo (♂) vel fere quadruplo (♀) latiore; antennis articulo secundo ultimis conjunctim aequalongis vel his paullulum brevioribus; rostro medium ventris attingente vel paullo superante; pronoto lateribus minus acutis anticeque obsolete marginatis. Long. ♂ $4\frac{1}{4}$ — $4\frac{1}{2}$, ♀ 4 — $4\frac{1}{2}$ mm.

Syn.: *Amblytylus concolor* JAKOVL., Bull. Soc. imp. Mosc. 1877, II, 297!

Hab. in Rossia meridionali (Astrachan!), D. JAKOVLEFF; Hungaria (Buda!), D. D.: v. HORWATH.

Descr.: Ab *A. nasuto* KIRSCHB. et affini FIEB. corpore pilis nigris supra omnino destituto divergens; ab *A. brevicollis* FIEB. structura antennarum et pronoti, ab *A. testaceo* REUT. structura capitis, longitudine rostri coloreque distinctus. Corpus oblongum (♂) vel ovale (♀); albido-virens, interdum obscurior, sordide pallide virens, supra longe densiusque pallide flavo-pubescens, subtus subtilius pallido-pubescens. Caput leviter nutans, pronoto paullo (♂) vel dimidio (♀) longius, pronoti latitudine postica circiter $\frac{2}{5}$ angustius, apicem versus longius productum, latitudine basali parum (♂) vel paullo (♀) longius, a latere visum altitudine dimidio vel magis quam dimidio longius, vertice oculo triplo (♂) vel fere quadruplo (♀) latiore, gula longa; albido-virens, maris vertice et fronte, linea hujus longitudinali excepta, dilute flaventibus. Oculi parvi, leviter prominuli, fuscis. Rostrum medium ventris attingens, apicem versus testaceum, apice piceo, articulo primo apicem xyphi attingente. Antennae colore corporis, pallide pubescentes, apicem versus saepe fusciscentibus, articulo secundo latitudini posticae pronoti aequali vel subaequali, maris nonnihil crassiusculo, duobus ultimis simul sumtis hoc vix vel parum longioribus, tertio secundo circiter $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{5}$ brevioribus et quarto magis quam duplo longiore. Pronotum basi longitudine paullo magis quam duplo latius, lateribus minus acutis et ad callos obsolete marginatis; albido-virens, callis dilute flaventibus. Hemelytra albido-virentia, pellucentia, angulo apicali interiore corii basaliq. interiore cunei dilutissime fusciscentibus, ibique punctis ad basin pilarum fuscis; raro corio intus late, angulo interiore cunei areolae majore fuscis; membrana sub-hyalina, plerumque tantum parte interiore areolae majoris dilute fusciscente. Pectus et abdomen dilute et pallide virentia; hoc dorso concolori. Pedes colore corporis, pallido-pubescentes, femoribus subtus atomis paucis fuscis vix distinguendis adpersis, tibiis spinulis fuscis vel obscure testaceis, tarsis articulo tertio ipso apice unguiculisque nigris.

7. *Amblytylus testaceus* REUT.

Diagnosis: Sordide flavo-testaceus, supra dense longiusque flavo-pubescens, pilis in certa directione luminis fusciscentibus, antennis pedibusque flavicanti-