

ribus totis innotatis, tibiis spinulis brevibus nigris armatis, tibiis anticis tantum biserratim spinulosis; tarsis articulo ultimo apice nigro.

2. *Macrocoleus Signoreti* REUT.

Diagnosis: Pallide flavo-ochraceus, subtiliter flavo-pubescent, supra in hemelytris adpressim nigro-pilosa (pilae in exemplo tantum in cuneo distinguendae), antennis pedibusque pallido-pubescentibus, gula setis pallidis; femoribus posticis apicem versus atomis nonnullis fuscis obsoletis, subtus juxta marginem anteriorem serie macularum fuscescentium notatis, tibiis testaceo-spinulosis, spinulis sat subtilibus; hemelytris corio extra venam cubitalem cuneoque obscurius ochraceis; membrana albida, macula fusca apicem areolarum spatiumque infra eos usque ad medium marginis externi occupante, maculam ad apicem cunei albam postice late terminante; capite (♀) latitudine basali fere paullulum longiore, angulo faciali acuto, clypeo levius arcuato; rostro (♀) ventris $\frac{2}{3}$ basales haud superante. Long. ♀ $3\frac{4}{5}$ vel fere 4 mm.

Hab. in Gallia meridionali (Landes!). Unicum specimen communicavit D. Dr SIGNORET.

Descr.: Species signatura membranae coloreque pallido in ochraceum vergente etc. distincta. A *M. aurantiaco* FIEB. capite longius producto, minus declivi, levius nutante et tibiis testaceo- vel fere concoloriter spinulosis mox distinguenda. A *M. Bolivari* REUT. capite paullo minus producto, rostro breviore, colore multo pallidiore et minus laeto, tibiis aliter spinulosis divergens. Corpus (♀) oblongo-ovalc, pallide flavo-ochraceum, subtiliter flavo-pubescent, supra sub-glabrum (pilae verisimiliter in exemplo descripto detritae). Caput leviter nutans, latitudine basali pronoti circiter $\frac{3}{7}$, aut $\frac{2}{5}$ angustius, apicem versus sat longe productum et levius declive, pronoto paullo longius, latitudine basali cum oculis nonnihil longius, a latere visum altitudine basali circiter $\frac{2}{3}$ longius, clypeo levius arcuato, angulo faciali acuto, gula capite circiter duplo breviore, setis flavis instructo; vertice oculo $2\frac{2}{3}$ latiore (♀); ochraceum, medio pallidius. Oculi (♀) in genas minus longe extensi, leviter oblique positi, orbita interiore sub-recta. Rostrum flavescent, ventris $\frac{2}{3}$ basales haud superans, apice nigro, articulo primo medium xyphi superante. Antennae colore corporis, pallido-pubescentes, articulo primo apicem clypei attingente; secundo latitudini basali pronoti longitudine aequali, apicem versus leviter incrassato (♀); tertio secundo circiter $\frac{1}{5}$ breviore, quarto tertio circiter $\frac{3}{5}$ breviore. Pronotum apice longitudine parum latius (♀), latitudine basis circiter $\frac{2}{5}$ brevius, lateribus sub-sinuatis; unicoloriter pallide flavo-ochraceum vel fere stramineum. Scutellum colore pronoti, limbo basali lineaque media obscurius ochraceis. Hemelytra abdomen paullo superantia (♀), pallide flavo-ochracea vel fere straminea, corio parte exteriore extra venam cubitalem cuneoque obscurius ochraceis, basi corii tamen pallida; pilis nonnullis flavis in margine externo corii aliisque nigris nonnullis adpressis in cuneo distinguendis (verisimiliter hemelytra tota adpressim nigro-pilosa); membrana albida,