

aurantiaca; membrana dilute fumata, areolis concoloribus vel nonnihil flaventibus, areola minore interdum disco fusca, venis flavis vel aurantiacis. Pectus et abdomen pallidius flava, pallide flavo-pubescentia. Pedes flavi vel praesertim femoribus aurantiacis, subtilissime pallide flavo-pubescentes, femoribus omnino innotatis, tibiis sat longe nigro-spinulosis, spinulis tibiarum anticarum biseriatis, posteriorum triseriatis, tibiis intermediis adhuc serie spinularum flavarum graciliorum instructis, tarsorum articulo tertio dimidio apicali unguiculisque nigris.

4. *Macrocoleus naso* REUT.

Tab. I; fig. 2.

Diagnosis: Supra vitellinus, subtilissime pallido-pubescentes, in hemelytris pilis nigricantibus subtilioribus faciliter divellendis; subtus cum pedibus pallido-pubescentes; coxis anticis margine pallido-setosis, femoribus innotatis, tibiis nigro-spinulosis; pronoti et scutelli vitta media basique venae cubitalis corii pallidis; capite pronoto $\frac{2}{3}$ — $\frac{3}{4}$ et latitudine sua basali circiter $\frac{1}{3}$ longiore; antennarum articulo primo apicem clypei haud attingente; rostro apicem abdominis paullo superante. Long. ♀ $3\frac{3}{4}$ mm.

Hab. in insula Corsica!, D. Dr. PUTON.

Descr.: Transitus ad genus *Amblytylus* FIEB., REUT., formare videtur, ab hoc autem clypeo multo minus fortiter prominente, a latere viso leviter arcuato et ubique aequo lato, basi ejus paullo minus alte posita, pronoti lateribus immarginatis et antice haud acutis divergens. A *M. longirostri* FIEB., cui maxime affinis, structura capitis et pronoti, femoribus omnino innotatis, colore saturatius vitellino, commissura hemelytrorum ne minime quidem infuscata, corporeque minore distinctus videtur; a speciebus reliquis colore similibus capite rostroque longis mox distinguendus. Corpus supra vitellino-flavum, colore leviter in aurantiacum vergente, subtilissime flavo-pubescentes pilisque sat subtilibus saltem in hemelytris distinguendis nigris. Caput (♀) leviter nutans, latitudine pronoti postica fere $\frac{1}{3}$ angustius, apicem versus longissime productum, pronoto circiter $\frac{2}{3}$ — $\frac{3}{4}$ et latitudine sua basali circiter $\frac{1}{3}$ longius, e latere visum altitudine saltem dimidio longius, gula circiter $\frac{2}{3}$ capitidis longitudiuis; vertice oculo triplo latiore; angulo faciali fortiter acuto. Oculi nigro-fusci, oblique positi, feminae tantum ad medium capitidis altitudinis extensi, orbita interiore subrecta apicem versus divergentes. Rostrum apicem abdominis paullulum superans, flavum, apice articuli ultimi latius piceo, articulo primo medium xyphi paullo superante. Antennae vitellino-flavae, apicem versus obscuriores, articulo primo apicem clypei haud attingente. Pronotum basi longitudine paullo magis quam duplo latius, lateribus rectis, apice longitudine latiore, callis disci nonnihil discretis; vitellinum, vitta media pallide flava. Scutellum vitellinum, vitta media apice dilatata, pallide flava. Hemelytra vitellina vel pallide aurantiaca, basi venae cubitalis pallidiore, cuneo macula interna saturatius aurantiaca; membrana dilutissime fumata, venis albidis vel dilute flavescentibus, vena brachiali extus prope apicem linea fuscescenti marginata, areolis dilute fumatis, stria transversali infra maculam hyalinam ad