

ginato; tarsis posticis articulo secundo tertio haud vel parum longiore; unguiculis sat magnis, apice curvatis, aroliis medium unguiculorum longe superantibus, sat latis.

Habitant species hujus generis in parte meridionali territorii.

Descr.: Corpus ovale, supra pilis nigris faciliter divellendis, saepe sub-glabrum. Caput basi pronoti paullo minus quam duplo angustius, fortiter nutans et declive, antice visum quinquangulare, a latere visum altitudine haud longius, fere ut in *Thermocori* PUT. signatum, vertice ejus margine postico fere convexo-declivi, medio leviter sub-angulato-producto, clypeo haud prominente, basi cum fronte confluyente, levissime vel leviter arcuato, ipsa basi paullo infra lineam intermediam oculorum posita, angulo faciali acuto, genis sat altis, gula obliqua, dimidio capitis brevior. Oculi magni, oblongi, in capitis lateribus leviter oblique positi, in genas haud vel vix extensi. Rostrum segmentum ventralem tertium vel quartum paullo superans, articulo primo apicem xyphi fere attingente. Antennae nigro-pubescentes. Pronotum basi longitudine duplo vel vix duplo latius, lateribus rectis, apice longitudine paullo latius, disco apicem versus leviter declive, callis bene discretis, discoloribus vel discoloriter conspersis, margine apicali ipso medio levius sinuato. Scutellum basi detectum. Hemelytra completa, membrana bi-areolata. Alae hamo areolae a vena subtensa emisso, a basi venae decurrentis paullulum remoto. Xyphus prosterni aequilateraliter triangularis, convexus, crassus, medio vix visibiliter depressus, totus immarginatus. Mesosternum apicem versus leviter convexius, apice truncatum. Metasternum convexum. Coxae anticae medium mesosterni sat longe superantes. Pedes nigro-pubescentes, femoribus seriatim punctatis, tibiis spinulis nigris e punctis sat magnis nascentibus, tarsis posticis articulo ultimo secundo parum vel haud brevior, unguiculis modice longis, apice curvatis.

1. *Pachyxyphus caesareus* REUT.

Tab. I, fig. 7 a (caput).

Diagnosis: Supra nigro-pilosus, pilis autem valde fragilibus, saepe sub-glaber; capite et pronoto nitidis, flavo-testaceis; illo fortiter transverso, antice viso infra oculos maximos et valde prominentes subito minus longe fere constricto-acuminato, vertice sat depresso maculis quatuor in arcum postice concavum positis, interdum (♂) omnino confluentibus, clypeo basi tota vel tantum puncto medio basali et lineis duabus longitudinalibus genisque totis (♂) vel tantum loris nigro-piceis vel nigris, fronte utrinque macula magna basi cum maculis verticis confluyente, apice truncata piceo-nigra vel (♀) rufo-testacea; pronoto basi longitudine duplo vel fere duplo latiore, lateribus rufescente, callis dense nigro-piceo-conspersis vel (♀) tantum marginibus nigro-piceis, disco rufo-testaceo-conspersis, linea media longitudinali in scutellum continuata pallida; scutello hemelytrisque coccineis, vena et plerumque etiam suturis clavi, corio sutura clavi, vena cubitali in membranam usque, lineis longitudinalibus