

rectis apicem versus sat fortiter angustatis, apice distincte sinuato longitudine circiter $\frac{1}{4}$ angustius, disco apicem versus declive, callis sat discretis. Scutellum basi deductum. Hemelytra completa, membrana bi-areolata. Alae areola hamo a vena subtensa emisso, a basi venae decurrentis paullulum remoto. Xyphus prosterni triangularis, acuminatus, lateribus immarginatis nonnihil rotundatis, disco convexiusculo. Mesosternum sat convexum. Metasternum apice obtuse rotundatum. Coxae anticae medium mesosterni superantes. Pedes nigro-pubescentes, tibiis sat longe nigro-spinulosis, posteriores etiam nigro-punctatis; tarsis posticis articulo tertio secundo brevior, unguiculis sat magnis, basi dente vix acuto, sat alto, aroliis parvis.

1. *Placochilus seladonicus* FALL.

Diagnosis: Glaucus, supra pilis sat longis deflexis pilosus, subtus cum antennis et pedibus nigro-pubescentibus, unicolor vel interdum capite, apice pronoti basique scutelli aurantiaco-flavis; articulis rostri duobus ultimis, apice tibiatarum tarsisque nigro-fuscis; tibiis nigro-spinulosis, spinulis tibiatarum posteriorum e punctis parvis nigro-fuscis nascentibus. Long. $5\frac{1}{3}$ —6 mm.

Syn.: *Phytocoris seladonicus* FALL., Hem. Svec. 82, 11! *Capsus* id FLOR, Rh. Livl. I, 607, 85. H. SCH., Wanz. Ins. VI, 33, fig. 590. MEY., Rh. Schw. 79, 55. *Capsus (Phylus)* id. THOMS., Op. ent. IV, 450, 114. *Placochilus* id. FIEB., Eur. Hem. 317, 1. *Hoplomachus (Placochilus)* id. REUT., Hem. Gymn. Sc. et Fenn. 156, 2. —

Hab. in floribus *Centaureae scabiosae* (sec. D. J. SAHLBERG), *Galii molluginis* et *veri* (sec. D. MEYER-DUER); Europa media et meridionalis: Suecia australis (Scania!, FALLÉN, Oelandia!, D. Prof. BOHEMAN), Fennia orientalis, DD. J. SAHLBERG et GUENTHER; Livonia, D. Prof. FLOR; Rossia (Kasan), Germania (Berlin! in museo, Breslau, D. SCHOLTZ); Helvetia (Burgdorf), D. MEYER-DUER; Corsica!, D. SAUNDERS; Italia borealis!, D. REIBER; Persia!, D. Dr SIGNORET.

Descr.: Corpus glauco-virescens, supra pilis deflexis nigris sat longis dense pilosum, subtus brevius nigro-pubescentibus. Caput saepe colore in aurantiaco-flavum vergente, vertice oculo parum (♂) vel $\frac{1}{3}$ (♀) latiore. Oculi nigri. Rostrum nigro-fuscum, articulis duobus basalibus virescentibus. Antennae glauco-virescentes, nigro-pubescentes, apicem versus sordide vel fusciscenti-testaceis. Pronotum glauco-virescens, saepe apicis colore in aurantiaco-flavum nonnihil vergente. Scutellum saepe basi aurantiaco-flavescens. Hemelytra membrana cum areolis dilute fumata, venis albidis, vena brachiali extus sulphureo-marginata, macula hyalina ad apicem cunei apicem areolae minoris attingente. Pectus medio mesosterni fusco. Abdomen maculis saepe lateralibus uni-seriatis nigricantibus, dorso sat obscuro (♀). Pedes nigro-pubescentes, tibiis sat dense longius nigro-spinulosis, saltem spinulis tibiatarum posticarum e punctis parvis nigro-fuscis nascentibus, apice tibiatarum tarsisque nigro-fuscis.