

Gen. XI. **VORUCHIA** REUT.

Tab. I, fig. 10.

*Diagnosis:* Corpus oblongum; capite crasso et magno, sub-verticali, antice viso sub-aeqvilateraliter triangulari, clypeo crasso, arcuato, fere perpendiculari, a latere viso ubique latitudine subaequali, basi a fronte sub angulo acuto discreto, gula brevissima; oculis magnis, vix autem prominentibus (♀); rostro coxas posticas paullo superante, articulo primo medium xyphi attingente; pronoto brevi, margine apicali recto vel sub-recto; hamo areolae alarum e vena connectente mox juxta basin venae decurrentis excurrente; xypho prosterni basi longitudine latiore, subplano, lateribus et apice obtuse marginato, hoc late rotundato; tibiis pallido-spinulosis, tarsorum ungviculis majoribus.

*Habitat* species unica hactenus cognita in parte austro-orientali territorii.

*Descr.:* Genus hamo alarum areolae e vena connectente emisso insigne. Corpus oblongum, et crassum, pronoti basi vix magis quam  $\frac{1}{4}$  angustius ejusque apice paullulum latius, sub-verticale vel valde nutans, antice visum aequae-lateraliter triangulare, a latere visum longitudini altitudine sub-aeqvale vel hac paullulum brevius; fronte convexiuscula, clypeo a fronte linea transversali impressa discreto, basi longe supra antenarum basin in linea oculorum media posita, lato, basi sub angulo a latere viso acuto prominente, valde declivi — fere perpendiculari, a latere viso ubique latitudine fere aequali, angulo faciali acuto — sub-recto, gula brevi. Oculi magni, sed haud prominentes, orbita interiore recta apicem versus sensim divergentes, in genas sat extensi (♀). Rostrum coxas posticas paullo superans, articulo primo medium xyphi attingente. Antennae ad apicem oculorum interne insertae, articulo primo apicem clypei vix attingente, secundo latitudini posticae capitis longitudine sub-aequali et duobus ultimis conjunctis brevior. Pronotum breve, trapeziforme, basi recta longitudine duplo latius, lateribus rectis apicem versus leviter angustatum, apice longitudine circiter  $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{3}$  latius. Scutellum basi detectum. Hemelytra completa, membrana bi-areolata. Alae hamo areolae e vena connectente mox juxta basin venae decurrentis excurrente. Prosterni xyphus basi longitudine latiore, disco plano, lateribus apiceque obtuse marginatis, hoc late rotundato. Mesosternum breve. Terebra feminae medium ventris haud superans. Tibiae pallido-spinulosae. Tarsi ungviculis longioribus, sensim arcuatis, aroliis brevibus.

1. **Voruchia vittigera** REUT.

*Diagnosis:* Pallide flavo-virens, supra dilute croceo-flava, albo-pubescens, hemelytris vitta longitudinali limbi interni in clavo et corio fusco-punctata et in membranae albae partem mediam usque ad apicem ejus extensa fusca, vitta media longitudinali in apicem cunei excurrente croceo-flava, limbo externo corii late albo. Long. ♀  $3\frac{2}{3}$  mm.