

1. *Leucopterum longicolle* REUT.

Diagnosis: Albicanti-virescens, minus subtiliter albo-pubescens, antennis pedibusque albido-flavis, tarsorum apice ungviculisque fuscis; hemelytris albis, corio fascia apicali intus angustiore fusca; cunei apice venisque dilutissime sulphureis; membrana ad apicem venae cubitalis nebula flavescente; pronoto basi longitudine vix magis quam dimidio latiore, lateribus sub-sinuatis. Long. ♂ 4 mm.

Hab. in Turkestan (Karak!), D. FEDTSCHENKO.

Descr.: Corpus supra albicanti-virescens, minus tenuiter albo-pubescens. Caput virescens, fortiter nutans, pronoti basi circiter $\frac{2}{5}$ angustius, clypeo valde declivi, vertice oculo magno circiter $\frac{1}{3}$ latiore (♂). Oculi fusci, convexi, prominentes. Rostrum apicem mesosterni haud attingens, articulo primo brevi et dilatato, apicem capitis paullo superante, albidum, apice nigro. Antennae albido-flavae, corpori, hemelytris exceptis, longitudine aequales, articulo primo clypei apicem superante, secundo pronoti latitudini basali longitudine aequali, duobus ultimis conjunctim secundo longioribus, tertio secundo tantum circiter $\frac{1}{6}$ brevior, quarto tertio duplo brevior. Pronotum albido-virens, basi longitudine tantum circiter dimidio latius, lateribus sub-sinuatis apicem versus fortius angustatum, apice longitudine distincte angustius, disco apicem versus sat declive. Scutellum albido-virens, basi flavescens. Hemelytra alba, summo apice clavi fasciaque corii apicali intus angustiore, fusco-pubescens, fuscis; membrana cum areolis albida, venis albis, nebula parva infra apicem venae cubitalis flavescens. Pectus et abdomen virescentia; mesosternum obscure fuscum. Coxae anticae medium mesosterni attingentes. Pedes albi, tibiis albido-spinulosi, ipso apice, apice articularum tarsorum, articuli ultimi latius, ungviculisque fuscis.

2. *Leucopterum candidatum* REUT.

Diagnosis: Flavescens-albicans, albo-pubescens, antennis pedibusque albido-flaventibus, oculis, femoribus posticis apicem versus margine supero, ipso apice tarsorum ungviculisque fuscis; hemelytris albis, vena clavi venaque corii cubitali corioque ad suturam clavi sat late, cuneo venisque membranae sulphureis, corio fascia apicali ab angulo externo ad apicem fuscum clavi ducta limboque externo membranae infra maculam magnam ad apicem cunei positam albo-hyalinam fuscis, membrana extra venam brachialem et pone hujus medium macula sulphurea; pronoto virescente basi longitudine fere duplo latiore. Long. ♂ $5\frac{1}{2}$ mm.

Hab. in Rossia meridionali!, D. JAKOVLEFF.

Descr.: Corpus flavescens-albicans, subtus longius albo-pubescens, supra pubescentia parciore. Caput valde nutans, albicans, pronoti basi fere duplo angustius, ver-