

tice oculo magno circiter  $\frac{1}{3}$  latiore, clypei basi paullo infra lineam mediam oculorum posita (♂). Oculi fusci, convexi, prominentes, orbita interiore sinuati (♂). Rostrum apicem mesosterni attingens, articulo primo apicem capitis paullulum superante, albido-virens, apice piceo. Antennae albido-flaventes, articulo primo apicem clypei superante, secundo pronoti latitudine postica brevior. Pronotum virescens, callis albidis, basi longitudine fere duplo latius, angulis posticis sub-prominulis, apice longitudine vix angustius. Scutellum albido-flavens, apice virescente. Hemelytra alba, sat nitida, vena clavi, vena cubitali corii, corii sutura clavi praesertim apicem versus sat late cuneoque dilute sulphureis; membrana dilutissime fumata, intus cum areolis totis maculaque obliqua majore ad apicem cunei apicem areolae majoris attingente albo-hyalina; limbo externo pone hanc maculam latius fusco, venis dilute sulphureis, extus juxta venam brachialem et pone ejus medium macula sulphurea, in certo lumine fusciscente. Pectus et abdomen flavescenti-albicantia, mesosterno obscure fusco. Coxae anticae mesosterni medium attingentes. Pedes flavo-albidi, femoribus posticis margine supero apicem versus fusciscentibus; tibiis subtiliter albo-spinulosis, tarsis ipso apice articuli tertii unguiculisque fuscis; articulo ultimo tarsorum intermediorum duobus primis conjunctim aequae longo, posticorum autem his paullo brevior.

### 3. *Leucopterus fasciatus* JAKOVL.

Tab. V, fig. 2. Tab. I, fig. 13 (tarsus).

*Diagnosis.*: Supra albicanti-virescens vel sordide pallido-flavens, subtiliter albo-pubescens, capite, pronoto antice, basi scutelli (an semper\*) fasciaque corii apicali ubique latitudine aequali fuscis, hemelytris flavescenti-albis, membrana albicante, venis albidis, limbo externo infra maculam albidam ad apicem cunei positam late fusca; femoribus posticis dimidio apicali (an semper\*) nigro-fuscis, summo apice tarsorum fusco; rostro coxas intermedias haud attingente; pronoto basi longitudine circiter duplo latiore, lateribus rectis. Long. ♀  $3\frac{2}{3}$  mm.

*Syn.*: *Psallus fasciatus* JAKOVL. in litt.

*Hab.* in Rossia meridionali (Bogdo!), commun. D. JAKOVLEFF.

*Descr.*: Corpus supra albicanti-virescens vel sordide pallido-flavens, subtiliter albo-pubescens. Caput fere verticale, fusciscescit, clypeo sub-perpendiculari; vertice oculo circiter  $\frac{3}{4}$  latiore (♀). Oculi nigro-fusci, convexi, prominentes. Rostrum apicem coxarum anticarum superans, sed intermediarum apicem haud attingens, circiter tertiam apicalem partem mesosterni attingens, articulo primo capite brevior, testaceum, apice fuscum. Antennae dilute flavae, articulo secundo latitudine capitis parum longior. Pronotum pallide virescenti-flavescens vel pallido-flavens, apice saepe fusciscentibus, basi

Figura a D:re FIEBER colorata differt ab exemplo supra descripto basi scutelli concolore, membrana apicem versus leviter fumata areolis fuscis, minore nigricante, tarsis fusciscentibus, femorum apice concolore, ad hanc tamen speciem verisimiliter referenda.