

longitudine circiter duplo latius, lateribus rectis, apice longitudine paullo latius. Scutellum dilute virescenti-flavescens, basi plerumque fuscescens. Hemelytra sordide flavescenti-albida, apice clavi fasciaque corii apicali intus haud angustiore fuscis; membrana albida, venis flavescenti-albis, limbo externo infra maculam albidam ad apicem cunei positam late fusca. Pectus et abdomen pallide virescenti-flava. Coxae anticae medium mesosterni attingentes. Pedes albidi, femoribus posticis dimidio apicali (an semper?) nigro-fuscis, tibiis spinulis sat longis testaceis densius armatis, tarsis articulo ultimo ipso apice ungviculisque fuscis.

4. *Leucopteron* (?) *pallens* REUT.

Diagnosis: Supra pallido-flavens, longe albido-pubescentes, pilis in certa directione luminis dilute fuscous, unicolor, tantum oculis, apice rostri ungviculisque obscure fuscis; rostro coxas intermedias attingente; pronoto basi longitudine magis quam duplo latiore, lateribus rectis. Long. ♂ $3\frac{4}{5}$ mm.

Hab. in Rossia meridionali (Bogdo!), communic. D. JAKOVLEFF.

Descr.: A speciebus praecedentibus clypeo a medio deorsum vergente, tarsorum posticorum articulo ultimo duobus primis simul sumtis paullo breviore (secundo tamen longiore), coxis anticis rostroque longioribus divergens et ad genus proprium forsitan referendum. Corpus supra totum pallido-flavens, longe albo-pubescentes, pilis in certa luminis directione dilute fuscous, subtus flavescentes; totum unicolor. Caput latitudine pronoti basali circiter $\frac{2}{5}$ angustius, fere verticale, clypeo a medio deorsum vergente; vertice oculo circiter $\frac{2}{3}$ latiore (♂). Oculi convexi, nigro-fusci. Rostrum coxas intermedias attingens, pallide flavens, apice piceum, articulo primo caput superante. Antennae pallide flaventes, articulo secundo paullulum robusto, latitudini pronoti posticæ longitudine sub-aequales, articulis ultimis conjunctim secundo paullo longioribus, tertio secundo circiter $\frac{1}{5}$ breviore, quarto tertio duplo breviore (♂). Pronotum basi longitudine magis quam duplo latius, lateribus rectis, apice longitudine latius, disco vix declive, callis paullo saturatius flavis. Scutellum basi paullo saturatius flavum. Hemelytra venis membranae hyalinae pallide flarentibus. Coxae anticae medium mesosterni longe superantes. Pedes pallide flaventes, tarsis posticis articulo tertio secundo longiore, sed duobus primis simul sumtis paullo breviore, ungviculis fuscis, denticulo basali medium attingente.

Gen. XV. **HADROPHYES** (FIEB.) PUT.

Tab. I, fig. 15.

Diagnosis: Corpus oblongum; capite transverso, magno et crasso, verticali, a latere viso altitudine breviore, pronoti basi tantum circiter $\frac{1}{4}$ angustiore, clypeo crasso, perpendiculari, angulo faciali recto; oculis prominentibus; rostro coxas posticas attingente; antennis in linea inter apices oculorum insertis, ab